

COMITETUL DE REDACȚIE

Redactor responsabil:

ACADEMICIAN EM. POP

Redactor responsabil adjunct:

ACADEMICIAN N. SĂLĂGEANU

Membri:

C. G. GEORGESCU, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România;

ACADEMICIAN ALICE SĂVULESCU;

ACADEMICIAN T. BORDEIANU;

I. POPESCU-ZELETIN, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România;

C. SANDU-VILLE, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România;

N. GIOSAN, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România;

GEORGETA FABIAN — secretar de redacție.

Prețul unui abonament este de 60 de lei.

În țară abonamentele se fac la oficiile poștale, agențiile poștale, factorii și difuzorii din întreprinderi și instituții. Orice comandă din străinătate (numere izolate sau abonamente) se face prin CARTIMEX, Căsuța poștală 134—135, București, Republica Socialistă România sau prin reprezentanții săi din străinătate.

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice corespondență se vor trimite pe adresa comitetului de redacție al revistei „Studii și cercetări de biologie — Seria botanică”.

APARE DE 6 ORI PE AN

ADRESA REDACȚIEI:
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 296
BUCUREȘTI

Studii și cercetări de BIOLOGIE

SERIA BOTANICĂ

TOMUL 18

1966

Nr. 1

SUMAR

	Pag.
C. G. GEORGESCU și I. R. CIOBANU, Contribuții la cunoașterea unor specii de <i>Quercus</i> din R. P. Bulgaria	3
V. TUTUNARU, Cercetări asupra sistemului de rădăcini la <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl. și <i>Fraxinus pallisae</i> Wilm.	7
C. SANDU-VILLE, Cîteva micromicete noi din România	15
NATALIA MITROIU, Studiul palinologic al unor reprezentanți din cîteva familii ale polycarpicelor	25
V. SANDA, Cercetări asupra burulenilor din podgoriile Masivului Istria	35
P. C. POPESCU-DOMOGLED, Contribuții floristice din Banat	43
A. POPESCU, Plante noi și rare pentru flora Munteniei	49
V. ZANOSCHI, M. TOMA și GH. VITELARU, Contribuții la flora Dobrogii	55
E. PLĂMADĂ, Contribuții la cunoașterea brioflorei pădurii Hoia — Cluj	59
L. GRUIA, Noi alge pentru flora României	63
EMIL POP, VIOREL SORAN și MIRCEA ȘTIRBAN, Cîteva date privind efectul întinderii mecanice asupra mișcării protoplasmice	69
E. ȘERBĂNESCU, Cercetări asupra unor fenomene fiziologice la plante hibride și la formele lor parentale	81
CECILIA DJENDOV, Intensitatea respirației în decursul vîstjirii frunzelor la unele plante	83
VIORICA TĂNASE, Despre bilanțul energetic al fotosintezei la fasole	89

St. și cerc. biol. Seria botanică t. 18 nr. 1 p. 1—98 București 1966

CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA UNOR SPECII DE *QUERCUS* DIN R. P. BULGARIA

DE

C. C. GEORGESCU

MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

ȘI

I. R. CIOBANU

581(05)

În lucrarea de față se expun taxoanele din genul *Quercus* recoltate de pe teritoriul R. P. Bulgaria, dându-se totodată și localitatea de unde au fost colectate. *Quercus polycarpa* și hibridii *Q. × venusta*, *Q. × rosacea*, *Q. × budensis* și *Q. × szechenyiana*, precum și majoritatea taxoanelor intraspecifice, sînt semnați pentru prima dată în flora R. P. Bulgaria. Totodată s-a creat și un hibrid nou pentru știință, *Quercus polycarpoides* Georg. et Cioh.

Cercetările floristice asupra speciilor de *Quercus* din R.P. Bulgaria sînt relativ reduse și rezultatele lor nu sînt încă total publicate. În august 1964, primul autor a întreprins o excursie de studii în R.P. Bulgaria, cu care prilej s-au recoltat materiale de *Quercus* din teritoriile parcurse.

În prezenta comunicare se prezintă o listă a taxoanelor întîlnite. În lista noastră, *Quercus polycarpa* și hibridii *Q. × venusta*, *Q. × rosacea*, *Q. × budensis* și *Q. × szechenyiana* sînt semnați pentru prima dată în flora Bulgariei. De asemenea în marea majoritate, taxoanele intraspecifice citate în prezenta lucrare sînt noi pentru flora R.P. Bulgaria.

Flora Dobrogii și Cîmpiei Dunării de jos conține multe specii nord-balcanice al căror areal se prelungește din Bulgaria în țara noastră. Aceasta dovedește că în trecutul geologic al teritoriului din bazinul dunărean, climatul a acționat în același sens și a permis interpenetrații între flora țării noastre (reg. Dobrogea, București, Oltenia, Banat) și cea a Bulgariei (provincia moesică). Dintre elementele lemnoase termofile sudice, cităm: *Carpinus orientalis*, *Corylus colurna*, *Fagus orientalis*, *Castanea vesca*, *Quercus pedunculiflora*, *Q. dalechampii*, *Q. polycarpa*, *Q. cerris*, *Q. frainetto*, *Q. pubescens*, *Q. virgiliana*, *Juglans regia*, *Cotinus*

coggygia, *Acer monspessulanum*, *Cytisus anagyroides*, *Coronilla emerus*, *Fraxinus ornus*, *Syringa vulgaris* etc.

De ambele părți ale Dunării se observă următoarele caracteristici comune :

În ceea ce privește succesiunea altitudinală a vegetației din Balcani până la Dunăre și de aici până în Carpați, ea este aceeași, cu deosebirea că limitele altitudinale superioare ale etajelor de vegetație caracterizate prin specii de *Quercus* sint mai ridicate în Balcani decât în Carpați. De exemplu, cereto-gîrnițetele înaintază în Carpații Olteniei până la 450 m, iar în Balcani până la 650 — 700 m. Cereto-gîrnițetele constituie un etaj de vegetație în provincia moesiacă a R.P. Bulgaria, întocmai etajului asemănător din jumătatea de vest a Carpaților românești.

De ambele părți ale Dunării se deosebesc prin alte caracteristici, cum sint :

Platoul Balcanic al provinciei moesiace prezintă o stepă și o silvostepă foarte reduse înspre estul Deliormanului de sud (către Silistra și Turtukan). Tot acest platou a fost ocupat de cereto-gîrnițele, astăzi aproape în totalitate defrișate. În schimb la noi, în Cîmpia Dunării de jos avem stepa, silvostepa și cereto-gîrnițetele la altitudini joase, inferioare nivelului altitudinal al platoului nord-balcanic.

Stejarul brumăriu nu intră în componența arboretelor de silvostepă cum este cazul în țară noastră, ci rămîne pe terasele joase ale rîurilor, așa cum se petrece la noi în cursul inferior al Ialomiței. Interesante sint penetrațiile lui *Quercus petraea* și *Q. polycarpa* din provincia moesiacă a Bulgariei în cîteva locuri din cîmpia noastră dunăreană. Astfel se explică prezența acestor specii în pădurile Pielea, Țigănești, Comana, Cernica (reg. București), sub formă de exemplare izolate sau de mici pîlcuri. În R. P. Bulgaria aceste specii se prelungesc din Balcani până la Dunăre în tot lungul văilor înguste, pe versanții umbriți.

Calea principală de emigrare a elementelor termofile din nord-vestul Peninsulei Balcanice a fost pe linia Oltenița (România) — Silistra (R. P. Bulgaria) în direcția cărora pădurile din Deliormanul de sud sint foarte apropiate de pădurile din platforma Comanei.

O altă cale de emigrare o constituie văile afluențe de la S de Dunăre, pe unde, după cum s-a menționat, au pătruns speciile de gorun în pădurile din raionul Alexandria.

În cele ce urmează dăm lista taxoanelor recoltate din R.P. Bulgaria :

Quercus cerris L. var. *austriaca* (Willd.) Loud. f. *austriaca* : Bakodjin la sud de Jamba și var. *cerris* f. *laciniata* Loud. : Bakodjin și Boldușin la sud de Jamba.

Quercus petraea (Matt.) Liebl. : în Munții Balcani este specia de bază în componența pădurilor de gorun (seria *sessiliflorae*) f. *platyphylla* (Lam.) Schwz. subf. *platyphylla* : Kondolova, Zvezdet, Bosna (Munții Strandja), muntele Vitoșa (Sofia), către Beklemeto (Troian), Iablo, Gîrbovo.

f. *laciniata* (Lam.) Schwz. subf. *pinnata* (Schn.) Schwz. : muntele Vitoșa lângă Sofia, Kondolova, Zvezdet (Munții Strandja).

f. *laciniata* (Lam.) Schwz. subf. *lobulosa* Schwz. : Munții Pirini, deasupra satului Katunci, la 650 m altitudine.

Quercus dalechampii Ten. : semnalat de N. Stoianov și B. Stefanov în flora Bulgariei ca o varietate a lui *Quercus pubescens* ; de fapt, este o specie de sine stătătoare, distinctă de *Q. pubescens*, care face parte din altă serie decât *Q. dalechampii*.

f. *lancifolia* (Vuk.) Schwz. : muntele Vitoșa lângă Sofia și Kondolova, Munții Strandja.

Quercus polycarpa Schur. var. *polycarpa* : Gramatikova, Kondolova, între Malko — Tîrnovo și Gramatikova, Hagilata, deasupra localității Malko — Tîrnovo (Munții Strandja), Munții Pirini, deasupra satului Katunci.

Quercus pedunculiflora Koch este identificată de N. Stoianov și B. Stefanov ca varietate a lui *Q. robur*. Din sinonimiile date de acești autori specia nu poate fi identificată cu *Q. robur* L. var. *pubemla* Lasch. care este o varietate a lui *Q. robur*. Specia este răspîndită în teritoriul pontic al Bulgariei, pe terasele inferioare ale rîurilor. Marea majoritate a pădurilor de stejar brumăriu au fost defrișate și nu se mai găsesc decât arborete relict.

var. *atrachoclados* (Borb. et. Boreum.) Schwz. f. *atrachoclados*, subf. *rotundiloba* Georg. et Cretz. : Dolno, est de Kazanlık.

subf. *acutiloba* Georg. et Cretz. : Dolno, est de Kazanlık.

Quercus frainetto Ten. : foarte răspîndit în etajul cereto-gîrnițelor din platoul moesiac și din regiunile de dealuri și de munte.

var. *macrophyllus* (Koch) Schwz. f. *latiloba* (Beck.) Schwz. : în apropiere de satul Brestina între Kîrpan și Stara-Zagora.

Quercus pubescens Willd. : răspîndit în insulele de silvostepă din regiunea de dealuri și coline a munților Bulgariei.

ssp. *lanuginosa* (Lam.) Schwz. f. *pubescens* (Loud.) Schwz. și f. *pinnatifida* (Gmel.) Schwz. : la marginea orașului Kîrpan către Stara-Zagora.

Quercus virgiliana Ten. var. *congestoides* Georg. et Mor. și var. *tenorei* (DC.) Schwz. : găsite la un loc cu *Q. pubescens*, al cărui însoțitor fidel este în asociațiile xeromezofite. N. Stoianov și B. Stefanov au semnalat prezența lui *Q. virgiliana* prin varietatea sa *brachyphylla*.

Quercus kartwissiana Stev. var. *stranjensis* Stef. : în văile umbroase și pe terasele joase ale rîurilor din Munții Strandja. Este considerată ca o specie relictă din flora terțiară, avînd caractere intermediare între *Q. robur* și *Q. sessilis*.

Quercus × *budensis* Borb. (= *Q. pubescens* × *Q. virgiliana*) : întîlnit în localitatea Kîrpan, la vest de Stara-Zagora, în locurile unde se găsesc în amestec *Q. pubescens* și *Q. virgiliana* s-a produs o hibridare pe cale naturală între cele două specii.

Quercus × *venusta* Tătăr. (= *Q. dalechampii* × *Q. pedunculiflora*) : Dolno, la est de Kazanlık.

Quercus × *rosacea* Bechst. (= *Q. traea* × *Q. robur*) var. *jahnii* Simk. : în apropierea șoselei care duce către Malko — Tîrnovo.

Quercus × *szechenyiana* Borb. (= *Q. frainetto* × *Q. pubescens*) : între Kîrpan și Stara-Zagora.

Quercus × *polycarpoides* Georg. et Ciob. (= *Q. petraea* × *Q. polycarpa*).
Foliis ut *Q. petraea* sed coriaceae. Folia matura subtus glabra. Cupulae
ut *Q. polycarpa*. În Munții Pirini, deasupra satului Katunci, la 650 m
altitudine.

BIBLIOGRAFIE

1. ASCHERSON P. u. GRAEBNER P., *Synopsis der Mitteleuropäischer Flora*, Leipzig, 1908—1913, 4, 478—490; 510—525.
2. CAMUS A., *Les Chênes*, Paris, 1936—1939, 1—2.
3. DUMITRIU-TĂTĂRANU I., Com. Acad. R.P.R., 1956, 6, 3, 449—458.
4. GEORGESCU C. C., MORARIU I. și CRETZOIU P., *Revista pădurilor*, 1942, 3—4, 97—104.
5. GEORGESCU C. C., PETRUȚ M., CRETZOIU P. et MORARIU I., C.R. Acad. Sci. Roum., 1942, 6, 14, 180—182.
6. GEORGESCU C. C. et CIOBANU R. I., *Rev. roum. Biol., Série de Botanique*, 1964, 9, 3, 183—190.
7. — St. și cerc. biol., *Seria botanică*, 1965, 17, 1, 15—22.
8. SCHWARTZ O., *Monographie der Eichen Europas und des Mittelmeergebiet*, Res. Spec. nov. reg. veg., Berlin, 1937, 1—2.
9. СТОЯНОВ Н. и СТЕФАНОВ Б., *Флора на България*, София, 1948, 327—330.

Institutul de biologie „Traian Săvulescu”,
Sectorul de sistematică vegetală.

Primită în redacție la 25 septembrie 1965.

CERCETĂRI ASUPRA SISTEMULUI DE RĂDĂCINI LA *FRAXINUS ANGUSTIFOLIA* VAHL. ȘI *FRAXINUS PALLISAE* WILM.

DE

V. TUTUNARU

581(05)

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor asupra sistemului de rădăcini la *Fr. angustifolia* Vahl. și *Fr. pallisae* Wilm. în condiții edafice diferite. La speciile studiate nu s-au constatat deosebiri care ar putea constitui un caracter taxonomic. Tipul de înrădăcinare este cel trasant superficial.

Cunoașterea caracterelor biologice ale arborilor și arbuștilor, precum și modificările acestora sub influența condițiilor de mediu prezintă o deosebită importanță pentru silvobiologie în vederea alegerii speciilor de mare productivitate.

Printre aceste caractere, cel căruia i se dă importanță din ce în ce mai mare este al înrădăcinării.

Cercetările anterioare s-au ocupat mai mult de descrierea părților aeriene ale plantelor lemnoase. În ultimele două decenii s-au întreprins studii și asupra sistemului de rădăcini la aceste plante.

În vederea studierii rădăcinilor s-au elaborat mai multe metode de cercetare. Unele din acestea urmăresc sistemul de rădăcini în ansamblu, iar altele repartitia acestora pe categorii de grosimi în diferite orizonturi ale solului.

Cele mai multe cercetări s-au întreprins asupra stejarului, pinului și molidului, care s-au dovedit a avea o mare putere de adaptare în dezvoltarea rădăcinilor în raport cu condițiile edafice (2), (3). După cunoștințele noastre, la speciile de frasin s-au întreprins un număr restrâns de cercetări în această direcție (3), (5).

Cercetările întreprinse de noi se ocupă de particularitățile sistemului de rădăcini în ansamblu la *Fr. angustifolia* Vahl. și *Fr. pallisae* Wilm. Prin aceste cercetări s-a căutat să se afle puterea acestora de adaptare

la diferite condiții edafice în vederea culturii lor în cele mai proprii stațiuni, precum și modul lor de dezvoltare, ca un criteriu taxonomic.

Lucrările au fost efectuate în pădurea Frasinu (r. Buzău, reg. Ploiești) și pădurea Pustnicu (r. Lehliu, reg. București). Aceste stațiuni oferă condiții deosebite atât în ceea ce privește tipul de sol, cât și nivelul apei freatice și variația acesteia.

Pădurea Frasinu este situată în nord-estul Cîmpiei Române, la obârșia izvoarelor Călmățuiului, la 3 km ENE de satul Spătaru. Solul este de tipul soloneț rezidual, caracterizat printr-un accentuat proces de salinizare. Stratul de apă freatică, puternic mineralizat, se află la suprafața solului o bună parte din an (noiembrie-martie). În restul anului, chiar în lunile iulie-august când se înregistrează seceta cea mai intensă, nivelul apei freatice nu coboară sub 1 — 1,5 m.

Pădurea este alcătuită din *Fr. angustifolia* Vahl., *Fr. pallisae* Wilm., cu pîlcuri de *Ulmus foliacea* Gilib. și rare exemplare de *Quercus robur* L.

Flora ierbacee este în mozaic, cu pîlcuri de plante hidrofile și pîlcuri de plante halofile (8).

Pădurea Pustnicu din masivul păduros Brănești, la cca 20 km est de București, este a doua stațiune unde s-au efectuat cercetări asupra înrădăcinării la cele două taxoane indicate mai sus. Solul este de tipul brun-roșcat de pădure, slab podzolit, cu apa freatică la mare adîncime (10 — 12 m), cu o variație mică de nivel în decursul anului.

Tipul de pădure este cero-șleau, frasinul avîndu-și centrul de vegetație într-o vîlcea de unde s-a răspîndit sporadic și pe platou. Vegetația este caracteristică cero-șleaurilor; în locurile cu frasin se găsesc unele elemente ale șleaului tipic din care cităm speciile *Asarum europaeum* L., *Asperula odorata* L., *Viola silvestris* L., *Carex pilosa* Scop., *Allium bulgaricum* (Janka) Prod., *Mercurialis perennis* L., *Stachys silvatica* L., *Aegopodium podagraria* L. etc.

Ambele stațiuni fac parte din subprovincia pontodanubiană, ținutul de stepă al Cîmpiei Române de est (9).

Metoda întrebuintată în efectuarea operațiilor de dezrădăcinare a fost aceea a dezgropării progresive a tuturor rădăcinilor, pornind de la tulpină spre periferie. S-a ales această metodă deoarece rădăcinile taxoanelor studiate se găsesc aproape de suprafața solului.

Pentru reproducerea corectă a întregului sistem de rădăcini, suprafața dezgropată a fost caroiată, apoi desenată la scară.

În ambele stațiuni s-au ales arbori de vîrste și de dimensiuni relativ apropiate. Pe lîngă arborii de vîrste mari și mijlocii s-au dezrădăcinat și puieți. La arborii mari și mijlocii s-au urmărit pe toată lungimea rădăcinile mai groase de 1 cm, iar la puieți și cele sub această dimensiune.

Deoarece operațiile de dezrădăcinare sînt foarte grele, mai ales la arborii de dimensiuni mari, s-a ales pentru fiecare taxon cîte un exemplar de fiecare categorie de vîrstă.

REZULTATELE CERCETĂRILOR

În pădurea Frasinu s-au dezrădăcinat 2 arbori de 47 de ani ($\varnothing = 30$ cm, $h = 18$ m), 2 de 16 ani ($\varnothing = 9$ cm, $h = 6$ m) și 2 de 8 ani ($\varnothing = 3$ cm, $h = 3$ m), luîndu-se cîte un exemplar din fiecare taxon.

În condițiile din această pădure, puieții dezvoltă o rădăcină principală și numeroase rădăcini laterale care pornesc de sub colet. De regulă, rădăcina principală crește în profunzime pînă la 20 — 30 cm sau mai puțin, după care ia o direcție orizontală, dezvoltîndu-se ca și celelalte rădăcini laterale. În unele cazuri însă rădăcina principală pătrunde în sol pînă la 40 — 50 cm, după care își încetează creșterea.

Chiar din primii ani, puieții prezintă o îngroșare a tulpinii la bază și în regiunea de sub colet datorită rădăcinii principale, care se îngroașe puternic, și a rădăcinilor laterale numeroase, care pornesc din această regiune.

La arborii în vîrstă nu se mai diferențiază o rădăcină principală: fie că aceasta a luat o direcție orizontală, pierzîndu-se în masa celorlalte rădăcini, fie că și-a încetat creșterea de timpuriu și nu se mai recunoaște dintre rădăcinile verticale care se dezvoltă din cele laterale.

Rădăcinile laterale orizontale care pornesc din rădăcina principală din regiunea de sub colet sînt trasante și dispuse radial (fig. 2). Acestea depășesc în lungime cu 1 — 3 m proiecția orizontală a coroanei. Datorită numărului lor mare, regiunea imediat de sub colet împreună cu baza tulpinii se îngroașă puternic. Pe o distanță de 0,5 — 2 m de la baza tulpinii, rădăcinile laterale sînt puternic îngroșate și neramificate. De la această distanță ele se ramifică în evantai, formînd o rețea de rădăcini subțiri (1 — 2 mm), din ce în ce mai bogată spre periferie (fig. 1). Această rețea se află la o adîncime de 10 — 15 cm de la suprafața solului și are grosimea de 10 — 20 cm. Desimea rădăcinilor care formează această rețea fiind prea mare, împiedică rădăcinile altor plante sau chiar ale plantulelor de frasin să o străpungă. Din această cauză, aceste plante nu au la dispoziție pentru dezvoltarea rădăcinilor lor decît stratul de sol de deasupra rețelei de rădăcini.

Din cele de mai sus reiese că, în condițiile pădurii Frasinu, sistemul de rădăcini la cele două taxoane prezintă două zone: una interioară, în care sînt numai rădăcini schelet, groase neramificate, și alta exterioară, începînd de la 1,5 — 2 m de la tulpină, formată dintr-o rețea deasă de rădăcini subțiri.

Dezvoltarea bogată în rețea a rădăcinilor din zona periferică ne arată că acestea sînt adaptate fie să folosească apa din precipitații, care se scurge de pe suprafața exterioară a coroanei, fie necesității unei respirații intense în perioadele cînd apa freatică se află aproape de suprafața solului.

Rădăcinile de profunzime care pornesc de sub colet se dezvoltă vertical, pătrunzînd în sol pînă la 1 — 1,5 m, adică pînă la adîncimea maximă la care scade nivelul apei freatice.

Aceste rădăcini, spre deosebire de cele laterale orizontale, sînt mai subțiri și nu se ramifică decît în cîteva radicele scurte de 10 — 15 cm situate de obicei la aceeași profunzime în sol. Se vede deci că acești frasini sînt




Fig. 1. — Vedere parțială asupra sistemului de rădăcini la un exemplar de *Fr. pallisae* Wilm. în vîrstă de 47 de ani (pădurea Frasinu).




Fig. 2. — Vedere de ansamblu asupra sistemului de rădăcini la un exemplar de *Fr. angustifolia* Vahl. în vîrstă de 47 de ani (pădurea Frasinu).

adaptăți atît pentru folosirea apei freatice prin rădăcinile de profunzime, cît și pentru folosirea apei din precipitații prin radicele dezvoltate aproape de suprafața solului, din rădăcinile laterale orizontale.

Din cele de mai sus rezultă că tipul de înrădăcinare al acestor frasini este trasant, superficial, asemănător celui al molidului.

Cercetările noastre nu au dat la iveală nici o deosebire între tipul de înrădăcinare de la *Fraxinus angustifolia* Vahl. și *Fraxinus pallisae* Wilm.

Un caracter care merită a fi menționat este acela al flexibilității rădăcinilor la primul taxon și al rigidității acestora la cel de-al doilea taxon.

În pădurea Pustnicu (masivul păduros Brănești) s-a cercetat un număr egal de arbori de dimensiuni apropiate celor din pădurea Frasinu.

Deși condițiile edafice din această pădure sînt mult diferite de cele din pădurea precedentă, tipul general de înrădăcinare trasantă se păstrează pentru ambele taxoane. Ceea ce se diferențiază însă este modul de prezentare a ramificației rădăcinilor, numărul lor, grosimea și lungimea acestora etc.

La *puieti*, rădăcinile laterale orizontale sînt mai puțin numeroase, din care cauză tulpina nu mai prezintă acea îngroșare puternică la bază de care s-a vorbit în cazul precedent. Aceste rădăcini, în locul unei slabe ramificații, au o creștere în lungime mult mai mare.

Așa cum s-a constatat în pădurea Frasinu, rădăcina principală de regulă ia o direcție orizontală, crescînd împreună cu celelalte rădăcini laterale. În unele cazuri însă se dezvoltă vertical, comportîndu-se ca și rădăcinile de profunzime.

La *arborii în vîrstă*, rădăcinile schelet sînt de asemenea trasante, superficiale, cu o dispoziție generală radială. Aceste rădăcini se subțiază progresiv către vîrf, ramificîndu-se numai la extremități în cîteva rădăcini mai subțiri de ordinul 3 — 4.

În schimbul unei slabe ramificații (fig. 3) au o creștere în lungime aproape dublă (12 — 13 m). Lipsa unei ramificații puternice a acestora face să nu se mai diferențieze cele două zone de care s-a vorbit în cazul precedent. De asemenea, datorită numărului redus de rădăcini schelet care pornesc din zona învecinată coletului, tulpina nu mai prezintă o îngroșare puternică la bază.

Rădăcinile de profunzime (fig. 4) sînt și în acest caz destul de numeroase și pătrund în sol pînă la 1 — 1,5 m fiind asemănătoare celor de la arborii din pădurea Frasinu.

Din cele de mai sus rezultă că la cele două taxoane din pădurea Pustnicu înrădăcinarea este deosebită de cea din pădurea Frasinu numai în ceea ce privește numărul de rădăcini schelet, lungimea lor și ramificația acestora.

La arborii de vîrste mari din ambele stațiuni s-au constatat concreșteri mai ales la rădăcinile groase din apropierea tulpinii. Asemenea concreșteri nu au fost întîlnite între rădăcinile celor două taxoane sau între rădăcinile acestora și ale altor foioase.




Fig. 3. — Vedere de ansamblu asupra sistemului de rădăcini la un exemplar de *Fr. angustifolia* Vahl. în vîrstă de 47 de ani (pădurea Pusnicu).



Fig. 4. — Rădăcini verticale la un exemplar de *Fr. pallisae* Wilm. în vîrstă de 47 de ani (pădurea Pusnicu).

CONCLUZII

Din cercetările efectuate se desprind următoarele concluzii: Sistemul de rădăcini la *Fraxinus angustifolia* Vahl. și *Fraxinus pallisae* Wilm. în condițiile de sol cercetate este asemănător. Atît în profil orizontal, cît și vertical nu s-au constatat deosebiri evidente care ar putea constitui un caracter taxonomic.

Ambele taxoane au o înrădăcinare trasantă superficială. La puieți, deși se dezvoltă o rădăcină principală, aceasta, în cele mai dese cazuri, ia o direcție orizontală, crescînd la fel cu celelalte rădăcini laterale.

La arborii în vîrstă nu s-a constatat o rădăcină principală cu rol de pivot, rolul acesteia fiind preluat de mai multe rădăcini verticale, care se dezvoltă în profunzime, din rădăcinile laterale în imediata apropiere a tulpinii.

Deși tipul de înrădăcinare rămîne cel trasant superficial pentru ambele taxoane chiar în condiții edafice diferite, ceea ce se diferențiază însă de la o stațiune la alta este numărul de rădăcini care pornesc din tulpină, bogăția ramificațiilor acestora, lungimea lor etc. Astfel, pe solurile cu apă freatică aproape de suprafață, rădăcinile orizontale nu depășesc cu mult proiecția orizontală a coroanei, formînd, în schimb, o rețea bogată de rădăcini subțiri în zona periferică a acestora. Pe solurile profunde, cu apa freatică la mare adîncime, rădăcinile sînt slab ramificate, dar în schimb cresc în lungime.

Lucrarea a fost efectuată sub îndrumarea prof. C. C. Georgescu pentru care îi aducem mulțumiri.

BIBLIOGRAFIE

1. АФАНАСИЕВА Е. А. и ОЛОВЯНИКОВА И. Н., Труды Инст. Лес, 1958, 43, 124—137.
2. COSTIN E., CATRINA I., TRACI C., MUȘAT I. și IONESCU M., Bul. științ. Acad. R.P.R., Secția de biol. și șt. agron., 1956, 3, 2, 202.
3. ENESCU V. și colab., Bul. științ. Acad. R.P.R., Secția de biol. și șt. agron., 1955, 7, 4, 945—980.
4. ГРУДЗИНСКАЯ И. А., Труды Инст. Лес, 1956, 30.
5. ГУРСКИ А. А. Н., Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции, 1928—1929, 21, 3.
6. MARCU GH., *Studiul ecologic și silvicultural al grînițelor dintre Olt și Teleorman*, Edit. agro-silvică, București, 1965.
7. NEGULESCU E. și SĂVULESCU A., *Dendrologie*, Edit. agro-silvică, București, 1957.
8. ȘERBĂNESCU I., Dări de seamă Com. geol., 1954—1955, 42.
9. * * * *Monografia geografică a R.P.R.*, Edit. Acad. R.P.R., București, 1960, 1.

Institutul de biologie „Traian Săvulescu”,
Sectorul de morfologie și sistematică vegetală.

Primită în redacție la 11 februarie 1965.

CÎTEVA MICROMICETE NOI DIN ROMÂNIA

DE

C. SANDU-VILLE

MEMBRU CORESPONDENT AL ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

581(05)

Lucrarea de față reprezintă o continuare a cercetărilor asupra ciupercilor micromicete din România și cuprinde enumerarea a 25 de specii noi pentru țară, dintre care o specie nouă pentru știință (*Ascochyta aconiti*) și o formă de asemenea nouă (*euphorbiae-steposae*).

În continuare sînt prezentate alte 23 de specii de micromicete deja cunoscute în flora micologică a țării noastre, dar pentru care se indică plante-gazdă noi pentru știință sau pentru țară.

În continuarea lucrărilor noastre asupra microflorei din România, dăm în cele ce urmează rezultatele muncii noastre din ultimul timp. Așa cum se poate vedea din examinarea textului, în nota de față sînt cuprinse un număr de 25 de specii de micromicete din diferite ordine și familii, atît din grupul ciupercilor perfecte, cît și din cel al ciupercilor neperfecte. Una dintre speciile citate, și anume *Ascochyta aconiti* Sandu-Ville, este nouă pentru știință; la aceasta, în afară de diagnoza în limba română, am prezentat și o diagnoză corespunzătoare în limba latină. De asemenea, la specia *Gnomoniella amygdalina* Sacc. am separat o formă nouă — *euphorbiae-steposae* Sandu-Ville, la care de asemenea am dat diagnoza în limba latină. La celelalte specii, acolo unde am socotit că este necesar, am adăugat unele date care vin să completeze diagnozele din bibliografie care, adevărate, sînt necuprinzătoare. În felul acesta aducem aportul nostru critic asupra diferitelor diagnoze prea rigide. Cu aceasta credem că explicăm anumite variații mai ales în dimensiunile organelor măsurate, dimensiuni care pot să varieze foarte mult în funcție de planta-gazdă și de condițiile climatice ale locului și timpului cînd s-a făcut recoltarea materialului studiat.

Lucrarea de față se încheie cu enumerarea a 23 de specii de ciuperci micromicete deja cunoscute în micoflora țării noastre, dar pe care le

indicăm, pe plante-gazdă noi. Unele plante sînt gazde noi numai pentru țara noastră, altele trebuie considerate, pentru speciile respective, ca plante-gazdă noi pentru știință.

1. *Cucurbitaria conglobata* (Fr.) Ces. et de Not.

Schema di clas. Sfer. Ital., 214 (1863).

Syn: *Sphaeria conglobata* Fr. Obs. myc., I, 176 (1815).

Pe ramuri de *Betula verrucosa* Ehrh., la Poiana Stampei (r. Vatra-Dornei), 9. IX. 1963. Ascele cilindrice, scurt pedunculate, aproape sesile, rotunjite la capătul superior: $150 - 210 \times 15 - 18 \mu$ parafizate; sporii dispuși oblic pe un singur rînd, rareori — și atunci numai în parte — dispuși pe două rînduri, puțin ascuțit-rotunjiți la ambele capete, puternic strangulați în treimea inferioară, formînd astfel cu ajutorul unui perete transversal două porțiuni inegale: una superioară, mai mare și cu doi pereți transversali, și alta inferioară, mai mică și cu un singur perete transversal; pe lîngă cei 4 pereți transversali bine distincți, se mai observă și alți pereți transversali și longitudinali mai puțin distincți, care împart sporii în numeroase celule dispuse muriform; sporii sînt de culoare brună-întunecată, aproape netransparenți și au următoarele dimensiuni: $18 - 24 \times 12 - 15 \mu$.

Ciuperca este citată în bibliografia de specialitate pe care o posedăm ca o specie nesigură, întrucît autorii nu indică dimensiunile ascelor și ascosporilor. Completăm aceste lipsuri și cu unele date morfologice ce au rolul de a întregi diagnoza.

2. *Diaporthe circumscripita* Otth.

In Fuck., Symb. myc., 207 (1869).

Syn.: *Diaporthe leucostoma* Nitschke.

In Fuck., Fungi rhen., nr. 207 (1863—1865).

Pe tulpini moarte de *Sambucus ebulus* L. care au iernat, Babadag (r. Istria), 15. VI. 1963. Ascele cilindrice-fusiforme, sesile: $45 - 56 \times 7,5 - 9 \mu$; sporii dispuși în asce pe două rînduri, rareori oblic pe un singur rînd, fusiformi, atenuat rotunjiți la ambele extremități, puțin, dar evident strangulați la mijloc: $10,5 - 14 \times 3 - 4,5 \mu$.

3. *Diaporthe galiorum* Fuck.

In Symb. myc., 140 (1869).

Pe tulpini moarte de *Galium molugo* L. care au iernat, Stînceni (r. Toplița), 10. VII. 1964. Peritecii sferice, turtite, scufundate în scoarța pe care o sfîșie; ascele cilindrice: $38 - 46 \times 9 - 11 \mu$; sporii bicelulari,

cu celulele inegale, evident strangulați în dreptul peretelui median, la început incolori, apoi bruni: $12 - 17 \times 6,5 - 8 \mu$.

4. *Leptoshaeria nitschkei* Rehm

In Ascomyc., nr. 15-b (1881).

Pe tulpini moarte de *Campanula rapunculoides* L. care au iernat, Văratec (r. Tg.-Neamț), 15. VIII. 1962. Peritecii sferice, puțin turtite la bază și cu un por scurt și conic la partea superioară: $120 - 300 \mu$ în diametru; ascele cilindrice, drepte sau puțin încovoiate, scurt pedunculate, aproape sesile: $60 - 80 \times 7,5 - 9 \mu$; sporii dispuși în asce și cu una din celulele mediane mai lată, cu 1—2 picături uleioase mari și evidente în fiecare celulă, mai ales în cele mediane, la început incolori, apoi gălbui, iar în masă galbeni-brunii: $21 - 27 \times 4,5 - 6 \mu$.

Ciuperca este citată de C. Oudemans (7) numai pe *Campanula caespitosa* Scop., iar de W. Migula (6) numai pe *Adenostilis alliariae* (Gouan) Kern., astfel că specia *Campanula rapunculoides* L. trebuie socotită ca plantă-gazdă nouă pentru această ciupercă.

5. *Leptosphaeria senecionis* (Fuck.) Winter

In Rabenh., Kr. Fl. Deutschl., II, 469 (1887).

Syn.: *Pleospora senecionis* Fuck.

In Symb. myc., 136 (1869).

Pe tulpini moarte de *Senecio nemorensis* Led. care au iernat, Crucea (r. Vatra-Dornei), 10. VII. 1964. Peritecii sferice, puțin turtite, negre, scufundate sub epidermă pe care o sfîșie și astfel devin aproape superficiale: $250 - 350 \mu$ diametru; ascele aproape cilindrice, mult alungite, mai mult sau mai puțin scurt pedunculate: $80 - 110 \times 10,5 \mu$; sporii dispuși pe 2—3 rînduri, fusiformi, multă vreme incolori și indistinct septați și cu conținut granular, apoi cu trei pereți transversali și gălbui: $24 - 27 \times 4,5 \mu$.

6. *Ophiochaeta inulae* Feltg.

In Vechrstud. Pilzfl. Luxenb. Naotr., III, 178 (1903).

Pe tulpini moarte de *Inula helenium* L. care au iernat, Borsec (r. Toplița), 7. IX. 1963. Periteciile sferice la bază și conice la vîrf, păroase, cu numeroase asce scurt pedunculate, aproape sesile, cilindrice; cele mai multe asce sînt tinere și sterile în materialul studiat de noi.

7. *Gnomoniella amygdalina* Sacc.

In Syll. Fung., I, 418 (1882).

forma : *euphorbiae-steposae* Sandu-Ville n.f.

Dignoscitur a typo ascis minoribus : $30 - 40 \times 6 - 9 \mu$ (non $45 - 50 \times 8 \mu$).

Pe tulpini moarte de *Euphorbia steposa* care au iernat, Babadag (r. Istria), 15. VI. 1963. Periteciile scufundate în scoartă, sînt sferice-turtite, cu un gît cilindric care străpunge scoarta : $280 - 350 \mu$ în diametru ; ascele cilindrice-fusiforme, aproape sesile : $30 - 40 \times 6 - 9 \mu$; sporii, cîte 8 în fiecare ască, dispuși oblic pe un singur rînd sau, de cele mai multe ori, pe două rînduri paralele, sînt fusiformi, puțin curbați, ascuțiți către capete, cu cîte 4 picături uleioase în interior : $12 - 15 \times 2,5 - 3 \mu$.

8. *Dermatea carpinea* (Pers.) Rehm

In Rabenh., Kr. Fl. Deutschl., III, 250 (1896), c. icon.

Syn. : *Peziza carpinea* Pers.

In Syn. fung., 673 (1801).

Pe ramuri uscate de *Carpinus betulus* L., Bîrnova (r. Iași), 1. X. 1964. Ascele măciucate mai mult sau mai puțin scurt pedunculate : $120 - 180 \times 12 - 18 \mu$, încă tinere și cu sporii nediferențiați.

9. *Hypoderma commune* (Fr.) Duby

In Hyst., 4 (1861).

Syn. : *Hysterium commune* Fr., Syst. myc., II, 589 (1823).

Pe tulpini moarte de *Aconitum* sp. care au iernat, Crucea (r. Vatra-Dornei), 10. VI. 1964. Apotecii mici, liniare și cu conidii cilindrice, uniceleulare.

10. *Aposphaeria pulviuseula* Sacc.

In Syll. Fung., III, 175 (1884).

Pe ramuri de *Salix* sp., la Poiana Stampei (r. Vatra-Dornei), 9. XI. 1936. Picnidii sferice, puțin conice la partea superioară : $100 - 120 \mu$ în diametru ; sporii cilindrici, rotunjiți la ambele capete : $4 - 4,5 \times 1,5 - 2 \mu$; sporoforii : $7,5 - 9 \times 1,5 \mu$.

11. *Acochyta aconiti* Sandu-Ville n. sp.

Pete mari, neregulate ca formă și nedeterminate ca mărime, vizibile pe ambele fețe ale frunzelor, dar mai distincte pe fața superioară, izolate, apoi confluențe, și ocupînd aproape întreaga suprafață a frunzelor,

de culoare brună-negricioasă, apoi brună-deschis la centru, pe partea superioară a frunzelor, și brună-olivacee pe fața inferioară. Picnidiiile pe fața superioară a frunzelor, numeroase, sferice-turtite, cu peretele subțire brun-gălbui, mai întunecat la partea superioară : $75 - 135 \mu$ în diametru ; sporii cilindrici, drepti, uneori puțin încovoiați, rotunjiți la ambele capete, la început aglutinați și neseptați, apoi izolați și cu un perete transversal, strangulați, hialini : $10 - 15 \times 3 - 4,5 \mu$.

Pe frunze de *Aconitum moldavicum* Hacq., la Crucea (r. Vatra-Dornei) 10. VI. 1964.

Maculis grandibus, irregularibus et indeterminatis, amphigenis sed distinctioribus in pagina superiore foliorum, primo isolatis, dein confluentibus et fere totam paginam foliorum occupantibus, primo in pagina superiore fusco-brunneis-nigrescentibus, dein centro brunneo-pallidioribus et in pagina inferiore fusco-olivaceis. Picnidiiis epiphyllis, numerosis, sphaericis-depressis, parietibus tenuibus, brunneis, versus ostiola fuscioribus : $75 - 135 \mu$ diametro ; sporidiis cylindraccis, rectis vel hinc inde leniter tortuosis, utrinque rotundatis primo continuis et agglutinated, dein isolatis et medio septatis, non constrictis, hyalinis : $10 - 15 \times 3 - 4,5 \mu$.

Hab. in foliis vivis *Aconiti moldavici* Hacq. propo Crucea, distr. Vatra-Dornei ubi 10. VI. 1964 legimus.

12. *Cytospora ribis* Ehrenb.

In Sylv. Berol., 28 (1818).

Pe ramuri uscate de *Ribes sanguineum* Pursh, Iași (r. Iași), 1. VII. 1963. Sporii : $3 - 4,5 \times 1 \mu$; sporoforii : $24 - 27 \times 1 \mu$.

13. *Phomopsis arctii* (Lasch.) Trav.

Sec. Diedicke in Kr. Fl. Mark Brandenb., IX, 246 (1915).

Syn. : *Phoma arctii* Lasch.

In Klotzsch-Rabenh., Herb. myc., nr. 1046 (1).

Pe tulpini uscate de *Arctium tomentosum* Mill. care au iernat, Văratec (r. Tg.-Neamț), 18. VIII. 1964. Picnidii negre-olivacee, sferice-turtite, aproape superficiale. Sporii aproape drepti și cilindrici, puțin subțiați către ambele extremități, uneori puțin curbați, cu 2 picături de ulei : $7,5 - 9 \times 3 \mu$.

14. *Stagonospora molinae* (Trail) Diedicke

In Kr. Fl. Mark Brandenb., IX, 557 (1915).

Syn. : *Stagonospora subseriata* (Desm.) Sacc. var. *molinae* Trail.

In Trans. Crypt. Scott., 45 (1889).

Pe frunze de *Molinia coerulea* Moench., Poiana Stampei (r. Vatra-Dornei), 10. VII. 1964. Picnidiiile sferice, puțin turtite dorso-ventral, dispersate în spațiile internerviale : $90 - 120 \mu$; sporii fusiformi, ascuțiți,

puțin mai îngroșați la una din extremități, cu conținut granular și cu 4 — 5 pereți transversali : $24 - 32 \times 6 - 7,5 \mu$.

Se aseamănă foarte mult cu *Stagonospora subseriata* (Desm.) Sacc., de care se deosebește prin picnidii izolate, sporii ceva mai mari și fără picături uleioase evidente, ci cu conținut granular și pereții mai puțin distincti.

15. *Rhabdospora corticola* Mc Alpine

In Fung. Disca. Stone. fr. trees, Melbourne, 122, fig. 241, 242 (1902).

Pe scoarța ramurilor uscate de *Prunus armeniaca* L., Iași (r. Iași), 1.VII.1960. Picnidii și picnospori caracteristici.

16. *Rhabdospora dauci* Hollós

In Ann. Mus. Nat. Hung., IV, 132, tab. IX, fig. 39 (1906).

Pe tulpini moarte de *Daucus carota* L. care au iernat, Măgura (r. Bacău), 30.VII.1960. Picnidii sferice, de culoare brună-întunecată : $60 - 120 \mu$ în diametru ; sporii continui, drepti sau de cele mai multe ori ușor curbați semilunar, fusiformi, dar mai evident ascuțiți la una din extremități : $12 - 18 \times 1 - 1,5 \mu$.

17. *Rhabdospora euphorbiae* P. Brun.

In Liste Sphaerops. in Act. Soc. Linn. de Bordeaux, 52 (1886).

Pe ramurile tulpinale de la plantele moarte de *Euphorbia palustris* L. care au iernat, Maliuc (r. Tulcea), 11. VII. 1964. Picnidii sferice, puțin turtite, scufundate în substrat, brune-negricioase : $100 - 130 \mu$ în diametru ; sporii filamentosi, drepti sau uneori puțin vermiform încovoiați, unicelulari, hialini : $12 - 20 \times 2 - 2,5 \mu$.

Se pare că această specie este destul de rară, întrucât în bibliografia citată ea nu a fost găsită decât în Franța (Bordeaux).

18. *Microdiplodia mamma* Allesch.

In Rabenh., Kr. Fl. Deutschl., VII, 88 (1903).

Pe ramuri uscate de *Ligustrum vulgare* L., Cotnari (r. Hîrlău), 3. VII. 1964. Picnidii sferice, puțin turtite, negre-cărbunoase : $200 - 280 \mu$ în diametru ; sporii cilindrici, rotunjiți la ambele capete și nestrangulați în dreptul peretelui transversal : $7,5 - 12 \times 4,5 \mu$.

19. *Hendersonia diplodiopsis* P. Henn.

In Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb., XLVII, 12 (1905).

Pe ramuri uscate de *Lonicera xylosteum* L. care au iernat, Crucea (r. Vatra-Dornei), 10. VI. 1964. Picnidii scufundate în scoarța pe care o ridică puțin în sus și apoi o sfîșie, negre, sferice, puțin turtite : $150 - 200 \mu$ în diametru ; sporii cilindrici, puțin strangulați la mijloc, luînd astfel forma unui pișcot, la început hialini, apoi brunii, cu 2 — 3 pereți transversali și cu vacuole mari care umplu toată cavitatea celulelor, rotunjiți la ambele extremități : $7,5 - 12 \times 4,5 \mu$.

20. *Camarosporium hibisei* Hollós

In Ann. Mus. Nat. Hung., IV, 367 (1906).

Pe ramuri uscate de *Hibiscus syriacus* L., Podu-Iloaie (r. Iași), 5.VI.1963. Picnidiiile, negre-cărbunoase, sfîșie scoarța și devin evidente : $360 - 480 \mu$ în diametru ; sporii sînt eliminați în cordoane care se destramă foarte ușor ; la început sînt continui și hialini, apoi hialini și septați, iar în cele din urmă sînt brunii-gălbui, transparenti, cu 1 — 2 — 3 — 5 pereți transversali, cei mai mulți cu 3 pereți transversali și cu un singur perete longitudinal incomplet, nu sînt strangulați sau foarte rareori sînt foarte ușor strangulați în dreptul pereților transversali, sînt elipsoidali, drepti, uneori puțin curbați : $15 - 22 \times 6 - 9 \mu$, cei mai mulți : $18 \times 7,5 \mu$.

21. *Gloeosporium populi-albae* Desm.

24 Not. in Bull. Soc. Bot. Fr., IV, 799 (1).

Pe frunze de *Populus alba* L., Maliuc (r. Tulcea), 8. VII. 1964. Lagărele de spori : $570 - 750 \mu$ în diametru și așezate în pete brune pe fața superioară a frunzelor ; conidiile sînt fusiforme și puțin încovoiate : $12 - 15 \times 3 - 4 \mu$.

22. *Myxosporium marchandianum* Sacc. et Roum.

In Rev. myc., V, 36 (1884).

Pe ramuri uscate de *Corylus avellana* L., Babadag (r. Istria), 15. VI. 1963. Sporii drepti sau uneori puțin curbați rotunjit-trunchiați la ambele capete : $7,5 - 11 \times 3 - 4 \mu$, rareori prezintă câte 1 — 2 picături uleioase în interiorul sporilor.

23. *Cercospora apii* Fresen.

In Beitr., III, 91, tab. XI, fig. 46-54 (1863).

var. *carotae* Pass.

In Rendic. Acad. Lincei Roma, 4 Ver., VI, 470 (1890).

Pe frunze de *Daucus carota* L., Fundu-Hertii (r. Dorohoi), 1. VII. 1963. Conidioforii: $36 - 56 \times 4,5 \mu$; conidiile cu 3 - 9 pereți transversali: $45 - 77 \times 4 \mu$. Produce uscarea parțială a frunzelor mai bătrâne și lipsite de vitalitate.

24. *Cercospora heterosperma* Bresad.

In Ann. Myc., I, 129 (1903).

Pe frunze de *Solanum tuberosum* L., Iași (r. Iași), 1.VIII.1964. Produce pete brune-olivacee numai pe fața inferioară a frunzelor; conidioforii sînt noduroși, dințați la partea superioară, olivacei: $45 - 61 \times 3 - 4,5 \mu$; conidiile sînt alungit-fusiforme, puțin curbate, cu 1 - 5 pereți transversali (foarte rar cu 4 și 5 pereți): $25 - 54 \times 4,5 - 6 \mu$, hialine.

25. *Macrosporium diversisporium* v. Thümen

In Oesterr. Bot. Zeitschr., XXVII, 271 (1877).

Pe frunze uscate de *Zea mays* L., Podu-Iloaie (r. Iași), 6. XI.1964. Conidioforii sînt noduroși și apar în tufe, sînt septați și mai puțin colorați la partea superioară: $40 - 50 \times 4,5 - 5 \mu$; conidiile sînt de două tipuri, și anume unele mai mici, piriforme, cu 2 - 3 pereți transversali: $18 - 24 \times 10 - 15 \mu$, iar altele mai mari aproape cilindrice, prevăzute cu o setă lungă, incoloră și cu 5 - 12 pereți transversali: $33 - 50 \times 20 - 22 \mu$.

Încheiem nota de față cu enumerarea unor specii de micromicete care au fost găsite pe plante-gazdă noi pentru țara noastră sau chiar pentru știință. Astfel se citează:

1. *Ophiobolus tenellus* (Auersw.) Sacc. Pe tulpini moarte de *Daucus carota* L., care au iernat, Popeni (r. Bîrlad), 11. VII. 1963, și pe tulpini moarte de *Artemisia absinthium* care de asemenea au iernat, Heleșteni (r. Pașcani), 11. VII. 1963.

2. *Leptosphaeria doliolum* (Pers.) Ces. et de Not. Pe tulpini moarte de *Angelica silvestria* L. care au iernat, Văratec (r. Tg.-Neamț), 1. VIII. 1962.

3. *Leptosphaeria dumetorum* Niessl. Pe tulpini moarte de *Cirsium oleraceum* (L.) Scop. care au iernat, Văratec (r. Tg.-Neamț), 1. VIII. 1963.

4. *Leptosphaeria dolioloides* Auersw. Pe tulpini moarte de *Senecio umbrosus* W. et K. care au iernat, Lacul Roșu (r. Ghiorghieni), 5. IX. 1963.

5. *Sphaerotheca fuliginea* (Schlecht.) Salmon. Pe frunze de *Knautia arvensis* (L.) Coult., Iași (r. Iași), 10. X. 1963.

6. *Erysiphe umbelliferarum* de Bary. Pe frunze de *Chaerophyllum cicutaria* Vill., Văratec (r. Tg.-Neamț), 9. VIII. 1960.

7. *Erysiphe eichoracearum* DC. Pe frunze de *Achillea ptarmica* L., Ghiorghieni (r. Ghiorghieni), 6. IX. 1963 și pe frunze de *Inula germanica* L., Moșna (r. Huși), 13. VIII. 1962.

8. *Microsphaera abbreviata* Peck. Pe frunze de *Quercus conferta* Kit., Moșna (r. Huși), 13. VIII. 1962.

9. *Plowrightia ribesia* (Pers.) Sacc. Pe ramuri uscate de *Ribes grossularia* L., Lacul Roșu (r. Ghiorghieni), 5. IX. 1963.

10. *Stiotis radiata* (L.) Pers. Pe ramuri uscate de *Fraxinus excelsior* L., Letea (r. Tulcea), 11. VII. 1964.

11. *Phomopsis sambucina* (Sacc.) Trav. Pe tulpini uscate de *Sambucus ebulus* L. care au iernat, Babadag (r. Istria), 15. VI. 1963.

12. *Cytospora corni* West. Pe ramuri de *Cornus mas* L., Văratec (r. Tg.-Neamț), 30. VIII. 1964.

13. *Ascochyta graminicola* Sacc. Pe frunze și tecile frunzelor de *Melica altissima* L., Moșna (r. Huși), 13. VIII. 1962, și pe frunzele și tecile frunzelor de *Brachypodium silvaticum* (Huds.) R. et Sch., Moșna (r. Huși), 13. VIII. 1962.

14. *Coniothyrium olivaceum* Brun. Pe tulpini uscate de *Medicago falcata* L., Babadag (r. Istria), 11. VII. 1963.

15. *Darlucia filum* (Biv.) Cast. În lagărele de *Puccinia asparagi* DC. de pe *Asparagus officinalis* L., Iași (r. Iași), 10. X. 1963.

16. *Rhabdospora rudis* (Preuss) Sacc. Pe ramuri uscate de *Cytisus austriacus* L., Heleșteni (r. Pașcani), 11. VII. 1963.

17. *Microdiplodia microsporella* (Sacc.) Allesch. Pe ramuri uscate de *Eronymus europaea* L., Heleșteni (r. Pașcani), 11. VII. 1963.

18. *Hendersonia sarmentorum* West. Pe ramuri tinere și uscate de *Acer pseudoplatanus* L., Crucea (r. Vatra-Dornei), 10. VI. 1964.

19. *Camarosporium spiraeae* Cooche. Pe ramuri și tulpini uscate de *Spiraea ulmifolia* Scop., Borsec (r. Toplița), 9. VI. 1963.

20. *Coryneum microstictum* B. et Br. Pe ramuri uscate de *Rhus cotinus* L., Gura-Văii (r. Tr.-Severin), 10. VII. 1961.

21. *Ovularia vossiana* (Thüm.) Sacc. Pe frunze de *Cirsium erisithales* (L.) Scop., Lacul Roșu (r. Ghiorghieni), 6. IX. 1963.

22. *Didymaria didyma* (Unger) Schroet. Pe frunze de *Ranunculus sardous* Crantz, Timișoara, 11. VII. 1961.

23. *Ramularia macrospora* Fr. Pe frunze de *Campanula grossekii* Heuff., Moșca (r. Pașcani), 30. VII. 1962.

BIBLIOGRAFIE

1. ALLESCHER A., in RABENHORST, *Kryptogamen-Flora Deutschlands*, Leipzig, 1901, 1/VI; 1903, 1/VII.
2. BONTEA VERA, *Ciuperci parazite și saprofite din R.P.R.*, Edit. Acad. R.P.R., București, 1953.
3. DIEDICKE H., *Kryptogamen-Flora Mark Brandenburg*, Leipzig, 1915, 9/VII.
4. KIRCHSTEIN, *Kryptogamen-Flora Mark Brandenburg*, Leipzig, 1933, 7.
5. LINDAU G., in RABENHORST, *Kryptogamen-Flora Deutschlands*, Leipzig, 1907, VIII; 1910, IX.
6. MIGULA W., *Kryptogamen-Flora Deutschlands*, Berlin, 1910, III 1/1; 1913, III 3/1, 3/2; 1921, III 4/1; 1934, 4/2.
7. OUDEMANS C., *Enumeratio systematica fungorum*, Haga, 1919, 1; 1920, 2; 1921, 3; 1923, 4.
8. REHM H., in RABENHORST, *Kryptogamen-Flora Deutschlands*, Leipzig, 1896, 1/III.
9. ВАСИЛЬЕВСКИЙ Н. И. и КАРАКУЛИН Б. П., *Fungi imperfecti parasitici*, Москва, 1950, 2.
10. WINTER G., in RABENHORST, *Kryptogamen-Flora Deutschlands*, Leipzig, 1887, 1/II.

Institutul agronomic „Ion Ionescu de la Brad”, Iași,
Catedra de protecția plantelor.

Primită în redacție la 26 aprilie 1965.

STUDIUL PALINOLOGIC AL UNOR REPREZENTANȚI DIN CÎTEVA FAMILII ALE POLICARPICELOR

DE

NATALIA MITROIU

581(05)

Caracterile morfologice ale microsporilor studiați arată conturarea precisă a familiilor analizate (*Magnoliaceae*, *Winteraceae*, *Schisandraceae*, *Illiciaceae* și *Calycanthaceae*). S-a constatat o asemănare a polenului de *Magnoliaceae* cu cel de la *Calycanthaceae* prin prezența sulculilor. Polenul familiilor *Winteraceae*, *Schisandraceae* și *Illiciaceae*, deși este caracteristic pentru fiecare familie, prezintă totuși unele caractere comune.

Observațiile noastre asupra microsporilor de la reprezentanții familiilor menționate justifică și din punct de vedere palinologic noua clasificare a magnoliaceelor după G. Buchheim.

Lucrarea de față reprezintă a doua notă din cercetările palinologice efectuate asupra policarpicelor, grup cu importanță deosebită în evoluția plantelor superioare.

Dintre numeroasele familii ale policarpicelor în cadrul acestei lucrări au fost analizați microsporiile de la reprezentanții familiilor: *Magnoliaceae*, *Winteraceae*, *Schisandraceae*, *Illiciaceae* și *Calycanthaceae*, în total 13 specii, toate exotice; unele dintre acestea sînt cultivate în parcurile și grădinile botanice din țară. Datorită acestui fapt, analiza morfologică a polenului s-a făcut la unele specii pe material proaspăt, iar la altele pe material de ierbar, în ambele cazuri efectuîndu-se preparate cu polen pus în apă, cît și inclus în cloralhidrat.

S-au examinat următoarele caractere morfologice ale microsporilor: culoarea, mărimea și forma lor, grosimea sporodermei, precum și epistructura și structura acesteia în secțiune optică.

Prezentarea sistematică a materialului studiat s-a făcut ținîndu-se seamă de prelucrarea monografică a fam. *Magnoliaceae* și *Calycanthaceae* de către K. Prantl (10), precum și de clasificarea recentă a lui G. Buchheim (1).

Rezultatele observațiilor noastre sînt redată în cele ce urmează pentru fiecare unitate taxonomică în parte, indicîndu-se totodată și proveniența materialului analizat.

Fam. **MAGNOLIACEAE**

Polen heteropolar; subprolat-prolat-prolat sferoidal; monosulcat și aporat; grosimea sporodermei 1,2 — 2,1 μ .

Magnolia stellata Maxim. (Cult. Grăd. bot. Buc.). Polen subprolat-prolat, în apă ca și în cloralhidrat galben-cenușiu. Microsporii priviți apical 33,6 — 40,8 μ în diametru, în profil 38,4 — 45,6 \times 28,8 — 34,8 μ . Exina crassisexinată; sexina tegilat-scurt-baculată se rupe în general neregulat, desprinzîndu-se de nexină, care în sulcus este străbătută de întină sub formă de tub polinic. Suprafața sporodermei cu îngroșări liniare, variate ca formă și mărime, care dau sporodermei un aspect \pm reticulat-ornat (pl. I, fig. 1 a, b, c, d, e și f).

Magnolia obovata Thunbg. (Cult. Grăd. bot. Buc.). Polen subprolat în apă galben-cenușiu, în cloralhidrat galben-pal. Microsporii priviți apical 45,6 — 52,8 μ în diametru, în profil 55,2 — 62,4 \times 44,4 — 52,8 μ . Exina crassisexinată; sexina tegilat-baculată se comportă la fel ca la *M. stellata*; suprafața sporodermei mai fin reticulat-ornată decît la *M. stellata* (cf. pl. I, fig. 1).


Magnolia soulangeana Soulange-Bodin (= *Yulan* \times *liliflora*) (Cult. Grăd. bot. Buc.). Polen subprolat-prolat, în apă galben murdar, în cloralhidrat galben-pal. Microsporii priviți apical 46,8 — 54 μ în diametru, în profil 52,8 — 62,4 \times 40,8 — 46,8 μ . Celelalte caractere la fel ca la *M. obovata* (cf. pl. I, fig. 1).


Michelia champaca L. (Herb. gen. Cluj, nr. 150 453). Polen prolat, în apă galben-auriu, în cloralhidrat galben-pal. Microsporii priviți apical 33,6 — 37,2 μ în diametru, în profil 38,4 — 45,6 \times 25,2 — 33,6 μ . Exina cu sexina tegilat-scurt-baculată, sexina și nexina fiind aproape de aceeași grosime; suprafața sporodermei cu îngroșări iregulare care dau sexinei un aspect ornat (pl. I, fig. 2).

Liriodendron tulipifera L. (Cult. Grăd. bot. Buc.). Polen prolat sferoidal, în apă galben-bruniu, în cloralhidrat galben-pal, aproape incolor. Microsporii priviți apical 67,2 μ în diametru, în profil 72 — 74,4 \times 67,2 — 69,6 μ . Exina crassisexinată; sexina tegilat-scurt-baculată; întina subțire acoperită în dreptul brazdei (sulcus) de resturi de nexină; suprafața sporodermei verucos-reticulată (pl. I, fig. 3, a și b).

PLANȘA I

Fig. 1. — *Magnolia stellata* Maxim.; a, microspor văzut \pm apical, aspect exterior și parțial sporoderma în secțiune optică; b, microspor germinînd, cu sexina (sex) desprinsă de nexină; c, sector din suprafața sporodermei; d, sporoderma mărită (secțiune optică); e, conținutul microsporului ieșind din exină; f, microspor văzut lateral. Fig. 2. — *Michelia champaca* L.; microspor văzut lateral, aspect exterior și parțial sporoderma în secțiune optică. Fig. 3. — *Liriodendron tulipifera* L.; a, microspor văzut lateral, aspect exterior și parțial sporoderma în secțiune optică; b, microspor cu sulcus larg, văzut din față (1 20 \times . Original).





Fam. WINTERACEAE

Drimys winteri Forst. (Flora von Süd-Chile in Herb. gen. Cluj, nr. 7 298). Microsporii heteropolari asociați în tetrade ale căror dimensiuni variază între 46,8 și 50,4 μ ; în apă galbeni-bruni, în clorhidrat galbeni-aurii. Un microspor izolat este uniaperturat, prevăzut cu o apertură distală înconjurată de o arie \pm netedă; privit apical 33,6 — 36 μ în diametru. Exina crassisexinată, distinct reticulat-muri-simpilată: pilii mari, reușiți, formând un reticulum neregulat, iar spațiile din reticulum prevăzute cu pili mici, denși; grosimea acesteia 4,8 μ (pl. II, fig. 5, a și b).

Fam. SCHISANDRACEAE

Kadsura japonica (L.) Dun. (Ex Herb. Hort. Bot. Univ. Tokyoensis, nr. 144). Polen heteropolar, suboblat-oblat sferoidal; 6-colpoidat, dintre care 3 colpoizi sînt lungi și fuzionați la un pol, iar ceilalți 3 scurți alternează cu colpoizii lungi; la celălalt pol, cei 6 colpoizi ocupă 2/3 — 3/4 din raza microsporului; în apă galben-cenușiu, în clorhidrat galben-pal, aproape cenușiu. Microsporii priviți apical 25,2 — 27,6 μ în diametru, în profil 21,6 — 25,2 \times 25,2 — 27,6 μ . Colpoizii prevăzuți cu un șir de sinveruculi situați median în toată lungimea colpoidului. Sporoderma crassisexinată; sexina reticulat-muri-simpilată; intina subțire, exceptînd colpoizii, în dreptul cărora este îngroșată; grosimea sporodermei 1,4 — 2,4 μ (pl. II, fig. 6, a, b, c și d).

Schisandra axilaris (Bl.) Hk. f. et Th. (= *S. chinensis* Baill) (Ex. Herb. Hort. Bot. Reg. Kew.) Forma și caracterele morfologice ale microsporilor de la *Schisandra* la fel ca la *Kadsura japonica*; dimensiunile acestora 24 — 26,4 μ în diametru, în profil 19,2 — 22,8 \times 24 — 28,8 μ (cf. pl. II, fig. 6).

Fam. ILLICIACEAE

Illicium anisatum L. (Herb. gen. Cluj, nr. 2 657). Polen suboblat (oblat sferoidal), tricolpat sau 3-sincolpat (uneori 2-sincolpat), în apă galben-brun, în clorhidrat galben murdar. Microsporii priviți apical 27,6 — 34,8 μ în diametru, în profil 22,8 — 26,4 \times 25,2 — 33,6 μ . Colpii circa 4/6 — 5/6 din raza microsporului la un pol, iar la polul opus treptat

PLANȘA II

Fig. 4. — *Illicium anisatum* L.; a, microspor tricolpat văzut apical, aspect exterior; b, polen 3-sincolpat; c, polen 3-(parțial) sincolpat; d, polen 2-sincolpat; e, sector din sporodermă: epistuctură și secțiune optică (a, b, c și d = 1 120 \times ; e = 2 400 \times . Original). Fig. 5. — *Drimys winteri* Forst.; a, tetradă, aspect exterior; b, microspor izolat, aspect exterior și parțial sporoderma în secțiune optică (1 120 \times . Original). Fig. 6. — *Kadsura japonica* (L.) Dun.; a, microspor 6-colpoidat, văzut apical, aspect exterior și parțial sporoderma în secțiune optică; b și c, aspectul microsporilor văzuți la cei doi poli; d, sector din suprafața sporodermei (a = 2 400 \times ; b, c și d = 1 120 \times . Original).

îngustați la capete, aproape fuzionați sau fuzionați (sincolpat). Exina crassisexinată; sexina formată din plăci „poligonale” cu marginile ridicate, strîns alipite între ele, care dau sporodermei un aspect muri-baculat-reticulat; delimitarea între „plăcile” poligonale este evidentă la locurile de atingere dintre marginile ridicate ale acestora, care se evidențiază sub formă de reticulum printr-o ușoară adîncitură care delimitează „plăcile” între ele; suprafața sporodermei are un aspect reticulat-scrobiculat; grosimea acesteia $0,72 - 1,92 \mu$ (pl. II, fig. 4, a, b, c, d și e).

Fam. CALYCANTHACEAE

Polen subsferoidal, oblat sferoidal-suboblat; bisulculat și aporat; exina crassisexinată; sexina fin reticulată, muri-simpilată.

Calycanthus occidentalis Hook. et Arn. (Cult. Grăd. bot. Buc.). Culoarea microsporilor în apă galbenă murdar, în cloralhidrat galbenă-cenușie. Apical și în profil au următoarele dimensiuni: $52,8 - 61,2 \times 60 - 67,2 \mu$. Sulculii circa $2/3$ din raza microsporului, acoperiți cu veruculi mari dispuși \pm în șiruri radiale, la germinarea microsporilor se mărește longitudinal, uneori chiar contopindu-se; grosimea sporodermei $2,1 - 3,1 \mu$ (pl. III, fig. 7, a, b și c).


Calycanthus fertilis Walt. (Cult. Grăd. bot. Buc.). Culoarea microsporilor în apă galbenă-aurie, în cloralhidrat galbenă-cenușie. Apical și în profil $50,4 - 54 \times 51,6 - 56,4 \mu$. Sexina foarte fin reticulată-muri-simpilată; în rest la fel cu polenul de la *C. occidentalis* (pl. III, fig. 8, a și b).

Calycanthus floridus L. (Cult. Grăd. bot. Buc.). Culoarea microsporilor în apă galbenă-cenușie, în cloralhidrat galbenă-pal. Apical și în profil $38,4 - 46,8 \times 45,6 - 51,6 \mu$. Sulculii largi, îngustați la capete, ajung pînă aproape de poli; suprafața sulculilor cu veruculi mari, dispuși \pm radial. Sexina reticulat-muri-simpilată, cu aspect tegilat-baculată; grosimea sporodermei $2,1 - 3,1 \mu$ (pl. III, fig. 9).

Chimonanthus praecox L. (Cult. Grăd. bot. Buc.). Culoarea microsporilor în apă galbenă-cenușie, în cloralhidrat galbenă-pal. Apical și în profil $45,6 - 48 \times 56,4 - 60 \mu$. Sulculii foarte largi, bruse îngustați la capete, ajung pînă aproape de poli unde fuzionează sau se depășesc înaintînd paralel; suprafața sulculilor neregulat-verucoasă. Exina \pm crassisexinată; sexina muri-simpilată, \pm tegilat-baculată; suprafața acesteia foarte fin reticulată; grosimea sporodermei $2,1 - 2,4 \mu$ (pl. III, fig. 10, a, b și c).

PLANȘA III

Fig. 7. — *Calycanthus occidentalis* Hook. et Arn.; a, microspor văzut apical, aspect exterior și parțial sporoderma în secțiune optică; b, microspor văzut lateral; c, sector din suprafața sporodermei ($1120 \times$. Original). Fig. 8. — *Calycanthus fertilis* Walt.; a, microspor văzut apical; b, parte din microspor văzut lateral, aspect exterior și parțial sporoderma în secțiune optică (a = $560 \times$; b = $1120 \times$. Original). Fig. 9. — *Calycanthus floridus* L.; microspor văzut apical, aspect exterior și parțial sporoderma în secțiune optică ($1120 \times$. Original). Fig. 10. — *Chimonanthus praecox* L.; a și b, microspori văzuți apical; c, microspor văzut apical, aspect exterior și parțial sporoderma în secțiune optică (a și b = $560 \times$; c = $1120 \times$. Original).



★

Din observațiile noastre asupra microsporilor analizați reies următoarele concluzii :

Toate familiile studiate aici din punct de vedere palinologic (*Magnoliaceae*, *Winteraceae*, *Schisandraceae*, *Illiciaceae* și *Calycanthaceae*) sînt bine delimitate unele față de altele și în ceea ce privește caracterele morfologice ale microsporilor. Ca dimensiuni, microsporiile speciilor analizate sînt de categoria mediae-magnae, polen mare existînd numai în cadrul familiilor *Magnoliaceae* și *Calycanthaceae*.

Astfel familia *Magnoliaceae* se caracterizează prin polen subprolat-prolat-prolat sferoidal, monosulcat și aporat, care se întîlnește la diferitele genuri și specii care aparțin acestui grup.

Familia *Winteraceae*, de la care s-a studiat polenul de *Drimys winteri*, prezintă microsporiile uniți în tetrade, iar fiecare microspor este monoaperturat prevăzut cu o epistructură și structură a sporodermei specifică (reticulat-muri-simpilată). Acest polen de un tip deosebit are totuși unele caractere comune cu polenul de la fam. *Illiciaceae* și *Schisandraceae*.

Familia *Schisandraceae*, deși cuprinde genuri diferite, este unitară din punct de vedere palinologic. Atît speciile de *Schisandra*, cît și cele de *Kadsura* prezintă același tip de polen : suboblat-oblat sferoidal, 6-colpoidat, exina crassisexinată : reticulat-muri-simpilată. Microsporiile reprezentanților acestei familii, deși constituie un tip \pm unic de polen, se aseamănă cu microsporiile de la *Drimys winteri*, atît în ceea ce privește epistructura sporodermei (reticulată), cît și structura acesteia (muri-simpilat), precum și cu polenul de la *Illicium* prin prezența colpilor.

Din familia *Illiciaceae*, reprezentată printr-un singur gen : *Illicium*, microsporiile de la *Illicium anisatum* sînt izolați, forma lor variînd de la suboblat-oblat sferoidal și tricolpați sau 3-(2)-sincolpați ; este de asemenea caracteristică atît epistructura (muri-reticulată), cît și structura sporodermei, în secțiune optică. Caractere asemănătoare întîlnim și la polenul de *Illicium floridanum* analizat de Erdtman. Forma pe care o iau colpilor la această specie pe măsură ce microsporiile cresc, precum și epistructura acestora, fac ca microsporiile de la *I. floridanum* să se deosebească întrucîtva de cei de la *I. anisatum*. Astfel aperturile colpoide de la *I. floridanum* au fost omologate de către unii autori cu aperturile trilete ale sporilor de *Pteridophyta*, fapt pe care Erdtman îl neagă, arătînd că aperturile colpoide de la *I. floridanum* corespund cu brazdele lungi colpoide, fuzionate la unul din poli, de la microsporiile de *Schisandra*, ceea ce corespunde și cu constatările noastre. Prin aceste cîteva caractere, polenul reprezentanților din familia *Illiciaceae* aparține unui tip \pm unic, dar asemănător prin unele caractere cu polenul familiei *Schisandraceae*.

Familia *Calycanthaceae* este de asemenea bine conturată din punct de vedere palinologic. Microsporiile de la ambele genuri (*Calycanthus* și *Chimonanthus*) au aceeași formă, cu variații de la suboblat-oblat sferoidal, sînt însă bisulculați, cu suprafața sporodermei fin reticulată, iar sulculii, verucos-ornați, variază ca mărime la diferitele specii.

Comparativ, polenul familiilor *Magnoliaceae* și *Calycanthaceae* se aseamănă prin prezența sulculilor, dar se deosebesc prin numărul acestora : unul la *Magnoliaceae* și doi la *Calycanthaceae*. Acest fapt vine să confirme încă o dată înrudirea sistematică dintre cele două familii, subliniată încă de Prantl și mai recent de alți autori, pe baza diferitelor caractere morfologice, mai ales florale.

Totodată, prezența unui singur sulcus la polenul reprezentanților familiei *Magnoliaceae* trebuie considerată ca un caracter de primitivitate, care se întîlnește și la unele *Monocotyledoneae*.

Din analiza microsporilor care aparțin la diferite unități sistematice ale familiilor : *Winteraceae*, *Schisandraceae* și *Illiciaceae*, altă dată considerate ca triburi ale familiei *Magnoliaceae* (10), reies și din punct de vedere palinologic caracterele distinctive ale acestor familii, precum și relațiile lor de înrudire.

BIBLIOGRAFIE

1. BUCHHEIM G., *Magnoliales*, in ENGLER A., *Syllabus der Pflanzenfamilien*, Verl. Gebr. Borntraeger, Berlin, 1964, ed. a 12-a, 2.
2. CHADEFAUD M. et EMBERGER L., *Traité de Botanique systématique*, Masson et Cie, Paris, 1960, 2.
3. ERDTMAN G., *Pollen morphology and plant taxonomy. Angiosperms*, Stockholm and Mass., Waltham, Mass., 1952.
4. FIRBAS F., *Spermatophyta*, in STRASBURGER, *Lehrbuch der Botanik*, G. Fischer, Jena, 1962, ed. a 28-a.
5. * * * *Flora R.P.R.*, Edit. Acad. R.P.R., București, 1953, 2.
6. КУПЧАКОВА Л. А., ДАН СССР, 1954, 98, 2.
7. MITROIU N., St. și cerc. biol., Seria biol. veget., 1963, 15, 2.
8. MOHL H., Ann. Sci. nat. Botanique, seria a 2-a, 1835, 3.
9. MÜHLETHALER K., *Planta*, 1955, 46.
10. PRANTL K., *Magnoliaceae u. Calycanthaceae*, in ENGLER-PRANTL, *Nat. Pflanzenfam.*, W. Engelmann, Leipzig, 1891, partea a III-a, secția a 2-a.
11. TAKHTAJAN A., *Die Evolution der Angiospermen*, G. Fischer, Jena, 1959.
12. TARNAVSCHI I. T. și MITROIU N., *Cercetări palinologice asupra ranunculaceelor din R.P.R.* în *Probleme de biologie*, Edit. Acad. R.P.R., București, 1962.

Facultatea de biologie, Laboratorul de morfologia plantelor.

Primită în redacție la 31 august 1964.

CERCETĂRI ASUPRA BURUIENILOR DIN PODGORIILE MASIVULUI ISTRIȚA

DE

V. SANDA

581(05)

Lucrarea prezintă o listă a speciilor de buruieni din regiunea de podgorii a Masivului Istrița. Pentru fiecare din cele 114 specii găsite se indică tipul ecologic, forma biologică, originea fitogeografică, durata vieții și localitatea unde au fost găsite.

Se arată comparativ speciile de buruieni care predomină pe coastele sud-estice ale masivului, față de cele de la poalele acestuia.

Studiul buruienilor în țara noastră datează de peste un secol, importante contribuții la cunoașterea sistematicii, biologiei și modului lor de asociere aducând: A. Roche (1838), A. Kerner (1863), F. Pax (1898, 1908), Fl. Porcius (1885), A. Hayek (1916), D. Grecescu, Al. Borza (1927), Tr. Săvulescu (1930, 1937), G. Bujorean (1930), A. A. Arvat (1939), E. Topa (1939), A. G. Timuș (1940), I. Morariu (1943), I. Prodan (1946), Gh. Ionescu-Șișești (1955) etc. Cercetările s-au întreprins la început în cadrul unor lucrări care privesc întreaga floră a regiunii studiate, așa cum se mai procedează și în prezent (1), (10).

Ulterior apar numeroase lucrări cu caracter special în care se fac studii floristice și sistematice (6), (7), (8), (9), (12), (13), geobotanice și de ecologie (2), (3), (5), (9), (11), precum și cercetări asupra combaterii buruienilor prin diferite metode chimice și agrotehnice (4), (14), (15), (16).

În ultimul timp, dată fiind importanța mare care se acordă dezvoltării tuturor ramurilor agriculturii din țara noastră, se impune aprofundarea studiilor de biologie și de combatere a buruienilor. Până în prezent s-a

acordat atenție mai mare studiului buruienilor din diferite culturi agricole (2), (3), (9), (11), (12), (16), buruienile din culturile de plante lemnoase de orice natură fiind foarte puțin studiate (7).

Primele date asupra speciilor de buruieni din vii, precum și a abundenței lor în diferite anotimpuri, în special primăvara, le aflăm la A.A. Arvat (1939). El cercetează buruienile din viile situate pe terenuri joase, de luncă.

I. Prodan (8) dă o listă mai completă a buruienilor din vii, atât pe baza cercetărilor proprii, cât și a datelor din literatură.

Importante contribuții la studiul geobotanic al buruienilor din plantațiile de viță de vie aduc G. Bujorean și colaboratori (3). Autorii arată că gradul de îmburuienare pentru plantațiile de viță de vie este mai mic în comparație cu alte culturi.

În lucrarea de față se studiază, pe baza cercetărilor făcute în anii 1963 și 1964, buruienile podgoriilor Masivului Istrița, avându-se în vedere originea lor fitogeografică, formele biologice, tipul ecologic, durata vieții (trăinicia), precum și unele date de ecologie.

În acest scop s-au urmărit și recoltat materiale din următoarele localități¹: 1) comuna Tohani (r. Mizil, reg. Ploiești); 2) comuna Jugureni (r. Mizil, reg. Ploiești); 3) Dealul Istrița, deasupra comunei Pietroasele (r. Mizil, reg. Ploiești); 4) comuna Merei (r. Buzău, reg. Ploiești); 5) comuna Monteoru (r. Buzău, reg. Ploiești).

Alte prescurtări avute în vedere:

— *Forme biologice*: N = *Nanophanerophyta*; Ch = *Chamaephyta*; H = *Hemikryptophyta*; TH = *Hemitherophyta*; Th = *Therophyta*; G = *Geophyta*.

— *Tipul ecologic*: Ah = arheofite; Ap = apofite (transfuge).

— *Originea fitogeografică*: Eur = eurasiatice; E = europene; Cp = circumpolare; Ct = continentale; Pt = pontice; Pt-M ⇒ pontic-mediteraneene; SM = submediteraneene; Cs = cosmopolite.

— *Durata vieții*: A = anuale; B = bianuale; P = perene.

În urma cercetărilor efectuate s-au găsit un număr de 114 specii, aparținând la 30 de familii și 94 de genuri (tabelul nr. 1).

Prezența anumitor specii de buruieni depinde de modul de amplasare a plantațiilor de viță de vie. Astfel în cele situate pe coastele versantului sud-estic al Masivului Istrița predomină: *Lamium purpureum* L., *L. amplexicaule* L., *Cirsium arvense* (L.) Scop., *Chorispora tenella* (Pall.) DC., *Bromus tectorum* L., *Convolvulus arvensis* L., *Diploaxis muralis* (L.).

¹ Aceste localități sînt trecute în tabelul nr. 1 folosind numai numărul de ordine.

Tabelul nr. 1
Lista buruienilor din podgoriile Masivului Istrița

Nr. crt.	Denumirea buruienilor	Forma biologică	Tipul ecologic	Originea geografică	Durata vieții	Localitatea unde a fost găsită
1	<i>Achillea pannonica</i> Scheele	H	Ap	Eur	P	3
2	<i>Achillea setacea</i> W. et K.	H	Ap	Eur	P	1
3	<i>Adonis aestivalis</i> L.	Th	Ah	E	A	3
4	<i>Aegilops cylindrica</i> Host.	Th	Ap	Ct	A	1
5	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Th	Ap	SM	A-B	2 —
6	<i>Ajuga genevensis</i> L.	H	Ap	Eur	P	2, 3
7	<i>Allium rotundum</i> L.	G	Ap	SM	P	2, 3, 4
8	<i>Alyssum alyssoides</i> L.	Th	Ap	Ct	A	2, 3
9	<i>Amarantus retroflexus</i> L.	Th	Ap	Cs	A	2, 4, 5
10	<i>Anagallis arvensis</i> L. ssp. <i>carnea</i> (Schrank)	Th	Ah	Cs	A	2, 5
11	<i>Anagallis arvensis</i> L. ssp. <i>caerulea</i> Hartm.	Th	Ah	Cs	A	2
12	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	H	Ap	Cp	A-B	1, 2, 3, 4
13	<i>Aristolochia clematilis</i> L.	H	Ap	SM	P	2, 3, 4
14	<i>Artemisia absinthium</i> L.	H	Ap	Eur	P	1, 2
15	<i>Asperugo procumbens</i> L.	Th	Ah	Eur	A	3
16	<i>Atriplex tatarica</i> L.	Th	Ap	Eur	B	3
17	<i>Brassica rapa</i> L.	Th	Ah	E	A	2
18	<i>Bromus sterilis</i> L.	Th	Ap	Eur	A-B	2, 4, 5
19	<i>Bromus tectorum</i> L.	Th	Ap	Eur	A	1, 2, 3, 4
20	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Th	Ap	Pt-M	A	2
21	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth.	H	Ap	Eur	P	2, 4
22	<i>Calamintha acinos</i> (L.) Clairv.	Th	Ap	SM	A-B	2
23	<i>Camelina microcarpa</i> Andr.	H	Ap	Eur	A	2
24	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Th	Ah	Cs	A-B	2, 3, 4, 5
25	<i>Carex hirta</i> L.	G	Ap	E	P	3
26	<i>Chenopodium album</i> L.	Th	Ah	Cs	A	2, 4, 5
27	<i>Chenopodium hybridum</i> L.	Th	Ap	SM	A	2
28	<i>Chondrilla juncea</i> L.	H	Ap	Eur	P	4
29	<i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.	Th	Ap	Eur	A-B	1, 2
30	<i>Chrysanthemum corymbosum</i> L.	H	Ap	Eur	P	5
31	<i>Cichorium intybus</i> L.	H	Ap	Eur	P	2, 4
32	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	G	Ah	Eur	P	1, 2, 3, 5
33	<i>Clematis vitalba</i> L.	N	Ap	SM	P	2, 3
34	<i>Conium maculatum</i> L.	TH	Ap	Eur	A	5
35	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Andr.	Th	Ap	SM	A	2
36	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	H-G	Ah	Cs	A	1, 2, 3, 4, 5
37	<i>Coronilla varia</i> L.	H	Ap	Pt	P	1
38	<i>Cynodon dactylon</i> L.	G	Ap	Cs	P	1, 2, 3, 4, 5
39	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	TH	Ap	Eur	B	4
40	<i>Cytisus austriacus</i> L.	N	Ap	Pt	P	2
41	<i>Diploaxis muralis</i> (L.) DC.	Th	Ap	SM	P	1, 2, 3
42	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Herit	Th	Ap	SM	A	1, 2
43	<i>Echium vulgare</i> L.	TH	Ap	Eur	B	2

Tabelul nr. 1 (continuare)

Nr. crt.	Denumirea buruienii	Forma biologică	Tipul ecologic	Originea geografică	Durata vieții	Localitatea unde a fost găsită
44	<i>Equisetum arvense</i> L.	G	Ap	Cs	P	2
45	<i>Equisetum maximum</i> Lam.	G	Ap	Cp	P	2
46	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	H	Ap	Eur	P	3
47	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Th	Ap	SM	A	2
48	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Th	Ap	E	A-B	4
49	<i>Euphorbia salicifolia</i> Host.	H	Ap	Pt	P	2
50	<i>Fagopyrum convolvulus</i> (L.) H. Gros.	Th	Ap	Eur	A	2
51	<i>Fagopyrum sagittatum</i> Gilib.	Th	Ap	Eur	A	2, 4, 5
52	<i>Fumaria schleicheri</i> Soyer-Willemet	Th	Ah	Eur	A	1, 2, 3, 4, 5
53	<i>Geranium pusillum</i> Burm.	Th	Ap	E	A-B	2
54	<i>Glechoma hederacea</i> L.	H-Ch	Ap	Eur	P	2
55	<i>Glechoma hirsuta</i> W. et K.	H	Ap	Pt-M	P	2
56	<i>Heleocharis palustris</i> (L.) R. Br.	G	Ap	Cs	P	2
57	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	H	Ap	Eur	B-P	3, 5
58	<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Th	Ah	Eur	A	2, 3
59	<i>Hypericum perforatum</i> L.	H	Ap	Eur	P	4
60	<i>Lactuca serriola</i> L.	Th	Ah	Eur	B	1, 2, 4
61	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Th	Ah	SM	A	2, 3, 4, 5
62	<i>Lamium purpureum</i> L.	Th	Ah	Eur	A	3
63	<i>Lapulla echinata</i> Gilib.	Th	Ah	Eur	A-B	1, 2, 4
64	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	H	Ap	Eur	P	3, 5
65	<i>Leontodon asper</i> (W. et K.) Poir.	H	Ap	Eur	P	3
66	<i>Lepidium draba</i> L.	Th	Ap	Eur	P	2, 3, 5
67	<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill. var. <i>procera</i> Sims.	H	Ap	Ct	P	2, 4
68	<i>Lithospermum arvense</i> L.	Th	Ah	Pt-M	A-B	2, 3, 5
69	<i>Lolium perenne</i> L.	H	Ap	E	P	2
70	<i>Medicago lupulina</i> L.	Th	Ap	Eur	A	2, 4
71	<i>Medicago minima</i> (L.) Grubb.	Th	Ap	Eur	A	1, 3, 4
72	<i>Medicago sativa</i> L.	H	Ap	SM	P	4
73	<i>Melilotus albus</i> Medik.	TH-Th	Ap	Eur	B	3
74	<i>Muscari racemosum</i> Mill.	G	Ap	SM	P	2, 3
75	<i>Nonnea pulla</i> (L.) Lam.	TH-H	Ap	Pt-M	P	1, 2
76	<i>Origanum vulgare</i> L.	H	Ap	SM	P	2
77	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	G	Ap	SM	P	2
78	<i>Papaver dubium</i> L.	Th	Ap	SM	A	2, 3, 4
79	<i>Plantago lanceolata</i> L.	H	Ap	Eur	P	3, 4
80	<i>Poa pratensis</i> L.	H	Ap	Cp	P	5
81	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Th	Ah	Cs	A	2, 4, 5
82	<i>Ranunculus arvensis</i> L. var. <i>tuberculatus</i> (DC.) Mert.	Th	Ap	Eur	A-B	2
83	<i>Ranunculus repens</i> L.	H	Ap	Eur	P	3
84	<i>Reseda lutea</i> L.	H	Ah	E	B	1
85	<i>Salvia nemorosa</i> L.	H	Ap	Ct	P	1, 3, 4
86	<i>Salvia verticillata</i> L.	H	Ap	E	P	2, 3
87	<i>Senecio vernalis</i> W. et K.	Th-TH	Ap	Ct	A-B	1, 2, 3, 4
88	<i>Setaria viridis</i> (L.) R. et Sch.	Th	Ah	SM	A	1, 2, 4
89	<i>Setaria verticillata</i> (L.) R. et Sch.	Th	Ah	Cs	A	4

Tabelul nr. 1 (continuare)

Nr. crt.	Denumirea buruienii	Forma biologică	Tipul ecologic	Originea geografică	Durata vieții	Localitatea unde a fost găsită
90	<i>Sinapis arvensis</i> L.	Th	Ah	Cs	A	4
91	<i>Sisymbrium sophia</i> L.	Th	Ah	Eur	A	2, 3
92	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Ch	Ap	Eur	P	2
93	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.	Th	Ah	Eur	A	2, 4
94	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Th	Ap	Eur	B	2
95	<i>Stachys annua</i> L.	Th	Ap	SM	A	2
96	<i>Stellaria media</i> (L.) Cyr.	Th	Ah	Cs	A-B	2, 3
97	<i>Symphyltum officinale</i> L.	H	Ap	E	P	2
98	<i>Taraxacum officinale</i> Web.	H	Ap	Eur	P	1, 2, 3, 5
99	<i>Thlaspi arvense</i> L.	Th	Ah	Eur	A	2
100	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	Th	Ap	Eur	A	2, 3
101	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	TH	Ap	Eur	B	1, 2, 3, 4
102	<i>Trifolium medium</i> L.	H	Ap	Eur	P	2
103	<i>Trigonella coerulea</i> (L.) Ser.	Th	Ap	Pt	A	1
104	<i>Tussilago farfara</i> L.	G	Ap	Eur	P	3
105	<i>Urtica urens</i> L.	Th	Ah	Cs	A	2
106	<i>Vaccaria pyramidata</i> Medik.	Th	Ap	Eur	A	2
107	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Betsche	Th	Ah	SM	A	2, 3, 5
108	<i>Veronica hederifolia</i> L.	Th	Ah	SM	A	3, 4, 5
109	<i>Veronica opaca</i> Fries.	Th	Ah	E	A	2
110	<i>Veronica persica</i> Poir.	Th	Ap	SM	A	3, 4, 5
111	<i>Vicia cracca</i> L.	H	Ap	Eur	P	2, 3, 4
112	<i>Vinca herbacea</i> W. et K.	H	Ap	Pt	P	1, 2, 4
113	<i>Viola hirta</i> L.	H	Ap	Eur	P	3
114	<i>Xeranthemum annuum</i> L.	Th	Ap	Pt-M	A	1, 4

DC., *Fagopyrum sagittatum* Gilib., *Fumaria schleicheri* Soyer-Willemet, *Allium rotundum* L., *Alyssum alyssoides* L., *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth., *Holosteum umbellatum* L., *Conringia orientalis* (L.) Andr., *Lapulla echinata* Gilib., *Ornithogalum umbellatum* L., *Setaria viridis* (L.) R. et Sch., *Veronica hederifolia* L., *Valerianella locusta* (L.) Betsche, *Xeranthemum annuum* L. etc.

În plantațiile de la poalele masivului predomină: *Convolvulus arvensis* L., *Cynodon dactylon* L., *Cirsium arvense* (L.) Scop., *Fumaria schleicheri* Soyer-Willemet, *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik., *Chenopodium album* L., *Amarantus retroflexus* L., *Taraxacum officinale* L. etc.

Analizând originea fitogeografică a elementelor floristice (tabelul nr. 2) (fig. 1) constatăm că procentul cel mai mare îl ocupă elementele eurasiatice (43,85%), submediteraneene (18,42%), cosmopolite (13,15%) și europene (8,77%).

Dintre formele biologice procentul cel mai mare este ocupat de: *Therophyta* (49,14%), *Hemikryptophyta* (33,33%) și *Geophyta* (8,77%).

Examinând caracterul și originea ecologică a buruienilor din podgoriile Masivului Istrița constatăm că acestea aparțin la: apofite (74,56%) și arheofite (25,43%).

Tabelul

Repartiția buruienilor după elementele fitogeografice.

Elemente fito-geo- grafice	Forme biologice											
	N		Ch		H		TH		Th		G	
	nr. sp.	%	nr. sp.	%	nr. sp.	%	nr. sp.	%	nr. sp.	%	nr. sp.	%
Eur	—	—	1	0,87	21	18,42	5	4,38	21	18,42	2	1,75
E	—	—	—	—	4	3,50	—	—	5	4,38	1	0,87
Cp	—	—	—	—	2	1,75	—	—	—	—	1	0,87
Ct	—	—	—	—	2	1,75	—	—	3	2,63	—	—
Pt	1	0,87	—	—	3	2,63	—	—	1	0,87	—	—
Pt-M	—	—	—	—	1	0,87	1	0,87	3	2,63	—	—
SM	1	0,87	—	—	3	2,63	1	0,87	13	11,42	3	2,63
Cs	—	—	—	—	2	1,75	—	—	10	8,77	3	2,63
Total	2	1,75	1	0,87	38	33,33	7	6,14	56	49,14	10	8,77

După durata vieții speciilor de buruieni din podgorii, predomină cu puțin (49,12%) speciile anuale, față de cele perene (42,98%), speciile bianuale ocupând un procent mai mic (7,90%).

Prezența în procent ridicat a speciilor perene (42,98%) pune problema măsurilor intense agrotehnice care trebuie luate pentru a le stărpi.

Observațiile noastre arată că plantațiile de viță de vie neeconomice, părăsite, așa cum este cazul cu cele de la Jugureni, sînt invadate de buruieni ajungîndu-se ca în 3 — 5 ani să se stabilească vegetația naturală.

De aceea, pentru stîrpirea buruienilor din podgorii trebuie executate la timp lucrări de întreținere. Odată cu măsurile agrotehnice de terasare a dealurilor, în vederea extinderii plantațiilor de viță de vie, este de asemenea necesar să se aplice o agrotehnică adecvată, pentru stîrpirea buruienilor.

CONCLUZII

1. În podgoriile Masivului Istrița s-au găsit un număr de 114 specii de buruieni, aparținînd la 30 de familii și 94 de genuri, care reflectă trăsăturile florei sinantropice a acestei regiuni.

2. Din punct de vedere fitogeografic predomină elementele eurasiatice (43,85%) urmate de cele submediteraneene (18,42%); cosmopolite (13,15%) și europene (8,77%).

3. Dintre formele biologice predomină: *Therophyta* (49,14%), și *Hemikryptophyta* (33,33%).

4. Se remarcă predominanța apofitelor (74,56%), față de arheofite (25,43%).

5. Plantele anuale ocupă un procent cu puțin mai mare (49,12%) față de cele perene (42,98%).

nr. 2

formele biologice, tipul ecologie și durata vieții

total		Tipul ecologie				Durata vieții					
		Ap		Ah		A		B		P	
nr. sp.	%	nr. sp.	%	nr. sp.	%	nr. sp.	%	nr. sp.	%	nr. sp.	%
50	43,85	41	35,96	9	7,90	20	17,50	8	7,01	22	19,30
10	8,77	6	5,43	4	3,50	5	4,38	1	0,87	4	3,50
3	2,63	3	2,63	—	—	1	0,87	—	—	2	1,75
5	4,38	5	4,38	—	—	3	2,63	—	—	2	1,75
5	4,38	5	4,38	—	—	1	0,87	—	—	4	3,50
5	4,38	4	3,50	1	0,87	2	1,75	—	—	3	2,63
21	18,42	17	14,91	4	3,50	13	11,40	—	—	8	7,01
15	13,15	4	3,50	11	9,64	11	9,64	—	—	4	3,50
114	100	85	74,56	29	25,43	56	49,12	9	7,90	49	42,98

BIBLIOGRAFIE

1. BORZA AL., *Flora și vegetația pădurii Soca (Banloc) din Banat*, în *Probleme de biologie*, Edit. Acad. R.P.R., București, 1962, 203—297.
2. BUJOEAN G., POPESCU I. și POPESCU P. C., St. și cerc. biol. și șt. agric., Acad. R.P.R., Baza Timișoara, 1956, 3, 3—4, 97—143.
3. BUJOEAN G., GRIGORE ST., OPRIN C. și POPESCU P. C., St. și cerc. biol. și șt. agric., Acad. R.P.R., Baza Timișoara, 1960, 7, 1—2, 145—165.
4. IONESCU-SIȘEȘTI GH., *Buruienile și combaterea lor*, București, 1955.
5. MORARIU I., Bul. Grăd. bot. și al Muz. bot. Univ. Cluj, 1943, 23, 3—4, 131—212.
6. —, *Lucrări științifice*, Inst. Politehnic Brașov, seria silv., 1960, 4, 223—237.
7. MORARIU I. și PARASCAN D., St. și cerc. biol., Seria biol. veget., 1961, 13, 2, 203—221.
8. PRODAN I., *Flora pentru determinarea și descrierea plantelor ce cresc în România*, Cluj, 1939, 2, 446.
9. —, *Buruienile vătămătoare semănturilor, flnefelor și pășunilor*, Cluj, 1946.
10. SANDA V., CIOBANU R. I. și TUTUNARU V., St. și cerc. biol., Seria botanică, 1964, 16, 6, 477—495.
11. SORAN V., *Cercetări asupra buruienilor și asocierii lor în Munții Apuseni*, în *Probleme de biologie*, Edit. Acad. R.P.R., București, 1962, 299—345.
12. TIMUȘ A. G., *Publicațiile I.C.A.R.*, 1940, 68.
13. ȚOPA E., Bul. Grăd. bot. și al Muz. bot. Univ. Cluj, 1947, 27, 1—4, 181—188.
14. ZAHAREANU N., *Combaterea buruienilor*, București, 1911.
15. ZAHARIADI C., *Probleme agricole*, 1955, 1.
16. ZAHARIADI C. și DRIMUȘ R., *Anal. I.C.A.R.*, seria nouă (1950—1951), 1954, 21, 2, 3—38.

Institutul de biologie „Traian Săvulescu”,
Sectorul de morfologie și sistematică vegetală.

Primită în redacție la 11 februarie 1965.




Fig. 1. - Spectrul geobotanic al buruienilor din podgorii.
I, Spectrul elementelor fitogeografice; II, spectrul biogeografic; III, spectrul formelor ecologice; IV, spectrul trăiniei speciilor.

CONTRIBUȚII FLORISTICE DIN BANAT

DE

P. C. POPESCU - DOMOGLED

581(05)

Lucrarea prezintă trei specii noi pentru flora României: *Linum gallicum* L., *Cirsium agram* (Jacq.) DC., *Hieracium* × *rubrum* Peter. și șase specii noi pentru Banat: *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss., *Colutea arborescens* L., *Plantago indica* L., *Plantago schwerzenbergiana* Schur, *Geranium palustre* Torner, *Secale montanum* Guss. La fiecare specie se fac unele considerații asupra răspândirii, ecologiei și cenologiei.

În lucrarea prezentă se comunică unele unități sistematice interesante aflate de noi recent în cuprinsul Banatului.

1. *Linum gallicum* L., Spec. pl., ed. 2 (1762), 401; Ldb., Fl. Ross-I, 422 pp.; Smalhausen, Flora I, 182 pp.; *L. trigynum* L., Spec. pl., ed. 1 (1753), 279; *L. aureum* Waldst. et Kit., Descr. et Ic. rar. Hung., II (1805), 193; *Cathartolinum gallicum* Rehb., Ic., VI (1844), 62. Este o plantă anuală, glabră, delicată, de 10 — 40 cm înălțime, de culoare galbuie; tulpina cu ramificații subțiri, erecte, terminate cu inflorescențe slab ramificate; frunzele alterne, sesile, liniar-lanceolate, de 1 cm lungime și 1 mm lățime, cele de jos sînt obtuze, cele dinspre vîrf ascuțite, cu 1 — 3 nervuri, frunzele glabre, pe margini scabre, cele de jos în timpul înfloritului cad. Inflorescența este un panicul asemănător cu o umbelă cu puține bractei, flori cu pedunculi subțiri, obișnuit nedepășind lungimea caliciului. Sepale de 2 — 3 (4) mm lungime, lanceolate pînă la ovate, vîrful obtuz cu un mucron, trinervate, pe margini ciliate; petalele sînt aproximativ de două ori mai lungi decît sepalele late de 5 — 6 mm, obovale, galbui, lucioase, cînd se vestejesc devin albe. Stigmat măciucat, uneori trifidat, capștile mici de 2 mm lungime, rotunde, obtuze; semințele pînă la 2 mm lungime, turtite, brune. Înfloreste în iunie-iulie, prelungindu-se pînă în octombrie.

Specia vegetează pe Dealul Tirolului din comuna Fizeș (r. Deta), pe pante înșorite, în pajiști, pe soluri brune, brune-gălbui, în asociații de *Festuca vallesiaca*, *Festuca sulcata*, cu o serie de plante însoțitoare ca: *Scabiosa ochroleuca*, *Carlina vulgaris*, *Dorycnium herbaceum*, *Achillea collina* ș. a.

Până în prezent această specie nu era citată din țara noastră (4), (5), (12). Planta este cunoscută însă din câteva țări vecine cu noi (6), (15), (16). Răspîndirea generală a speciei este Europa: R. P. Ungară, Franța, în jurul Mării Mediterane, Peninsula Balcanică; Asia Mică, Iran. În U. R. S. S., planta este cunoscută din Caucaz: estul și vestul Transcaucaziei, prin pajiști.

2. *Cirsium afrum* (Jacq.) DC. Cat. h. Monsp., 96. *Carduus afrum* Jacq., H. Schoenbr., II, 180, T. 145; *Chamaepeuce afra* DC., Pr., VI, 659; *Carduus casabonense* Ch. et B., Fl. Pelop., 56; *Cirsium cynarioides* Grsb., Spic., II, 254, non Spreng. (7), (15), (16). Planta vegetează în Cheile Nerei (comuna Sasca, r. Oravița), pe un grohotiș calcaros, unde alcătuiește o fitocenoză încheiată, împreună cu o serie de plante ruderales. Condițiile staționale corespund cu cele din R. P. Bulgaria (16).

Din punct de vedere fitogeografic, Cheile Nerei constituie o prelungire firească a Clisurii Dunării. În aceste chei, tăiate în carștul bănățean, se resimte o puternică influență sudică, în condițiile căreia cresc specii de plante și fitocenoze termofile.

Principalele asociații vegetale de aici sînt: asociația de *Stipa pulcherrima*, asociația de *Koeleria glauca*, de *Bromus riparius* ș. a. Amintim speciile mai deosebite: *Carpinus orientalis*, *Dianthus giganteus*, *Dianthus trifasciculatus*, *Silene flavescent*, *Silene viridiflora*, *Centaurea atropurpurea*, *Achillea crithmifolia*, *Echinops banaticus*, *Tragopogon floccosus*, *Scorzonera austriaca*, *Hesperis cladotricha*, *Allyssum saxatile*, *Scabiosa banatica*, *Cephalaria laevigata*, *Euphorbia lingulata*, *Quercus pubescens*, *Geranium lucidum*, *Iris graminea*, *Sesleria filifolia*, *Genista ovata*, *Cytisus falcatus*, *Cytisus elongatus*, *Allium moschatum*, *Allium oleraceum*, *Ornithogalum pyrenaicum*, *Linum tenuifolium*, *Orchis simia*, *Cephalanthera alba*, *Veronica crinita*, *Seseli gracile*.

În țara noastră, specia nu este amintită pînă în prezent (4), (12). Acad. E. I. Nyárády, care a verificat și materialul de față, confirmă raritatea acestei specii găsite și de d-sa în regiunea Ploiești.

Aria geografică generală a speciei este Europa de sud în R. S. F. Iugoslavia, Grecia, R. P. Albania, R. P. Bulgaria. A. Hayek citează prezența speciei în câteva provincii din țările amintite: Macedonia, Thesalia, Hertegovina, Serbia, apoi în Grecia și R. P. Albania (7). I. Velenovschy notează prezența speciei în 12 localități din R. P. Bulgaria (16).

Descrierea speciei corespunde cu cea făcută de Hayek: plantă bianuală cu tulpina alb-tomentoasă, cu mai multe antodii dispuse într-un corimb. Frunzele pe fața superioară de culoare verde și pe partea inferioară alb-tomentoase, sinuate-penati-lobate, cu segmente trifidate terminate prin spini. Capitule lungi de 3—4 cm, dispuse într-un corimb dens. Involucrul, format din frunze spars-arachnoideu-lanate, liniar lanceolate, carinate, se termină cu spini rigizi erecti. Flori purpurii-ros (7).

3. *Hieracium* × *rubrum* Peter., în Flora, 126 (1881), N. P. 321, 2 T. = *aurantiacum* × *flagellare*. *Hieracium* × *rubrum* Peter. are frunzele bazale mult mai păroase decît *Hieracium aurantiacum*, cu inflorescențele dispuse în panicule, cu ramuri puțin îndepărtate, dicotomice, cu 2—6 antodii (1), cu involucrul lung de 8—11 mm; florile de culoare purpurie-portocalie, se deosebesc de *Hieracium flagellare* prin prezența unor stoloni subțiri. Diferă de *Hieracium stoloniferum* prin frunze mai puțin păroase, capitule mai numeroase, tulpini ramificate dicotomic și prezența stolonilor subterani (2). P. Ascherson și P. Graebner citează specia din masive înalte (2). În Banat, pe muntele Semenice, s-a găsit în gol de munte la peste 1 400 m altitudine. La altitudine mai mică (850—900 m) s-a aflat var. *banaticum* Nyár. (= *aurantiacum* × *flagellare* vel. *aurantiacum*) (*caespitosum* × *pilosella*), în mlaștinile turboase de pe malurile pîrului Grădiștei dintre Gârșina și Trei Ape.

4. *Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss. Potrivit datelor cuprinse în Flora R. P. R., această specie cu răspîndirea generală în Africa de nord-est, Asia de est, adventivă în diferite locuri pe glob, se află în țara noastră numai în Dobrogea (5).

Planta s-a găsit în cantitate mare în comuna Sînpetru-Mare (r. Sînnicolau-Mare), îndeosebi în culturi de borceag de primăvară, pe care uneori la îmburuienează puternic. Alte specii care se află în fitocenoză sînt: *Delphinium orientale*, *Rumex stenophyllus*, *Pisum arvense*, *Lepidium draba*, *Cirsium arvense*, *Matricaria chamomilla* ș. a. Din observații rezultă că planta este consumată de animale, fiind o specie cu o creștere rapidă și timpurie în primăvară. De altfel, în U. R. S. S. această specie se cultivă ca o plantă oleaginoasă (6). Merită o atenție deosebită pentru a fi introdusă în cultură, îndeosebi în convelere verzi.

5. *Colutea arborescens* L. Această specie, cu răspîndirea generală în Europa centrală și de sud și Asia de sud-vest, nu este amintită din Banat (5). Ea a fost semnalată anterior, între localitățile Virciorova și Gura-Văii din defileul Dunării, unde planta crește în fitocenoze termofile pe coastele cu expoziție înșorită. A fost găsită la Șiria (r. Arad), în depresiunea de sub cetatea Șiriei. Această mică depresiune (de numai cîteva sute de hectare) posedă o floră și o vegetație bogate în specii de plante termofile. *Colutea arborescens* crește aici alături de *Quercus pubescens*, *Syringa vulgaris*, *Asyneuma canescens*, *Aster linosyris*, *Ortanthia lutea* ș. a.

Expoziția generală sudică a acestei depresiuni ferită de curenți și vînturi reci, prezența unui sol brun-gălbui (joltoziom) au creat condiții favorabile pentru creșterea și dezvoltarea unei vegetații deosebite de regiunile din jur.

6. *Plantago indica* L. Această specie, cu răspîndirea generală în Europa (centrală și de sud), Caucaz, Siberia, este citată în Flora R. P. R. din mai multe localități din țara noastră, dar nu a fost semnalată din Banat și Crișana (5).

Noi am aflat-o frecvent pe nisipurile din localitățile: Șilindru, Simian (citată și de Prodán, 1956), Valea-lui-Mihai, Curtuișeni, Piscolt, Resighea, Ciumești și Urziceni (reg. Crișana), Șanislău (reg. Maramureș).

În Banat, *Plantago indica* s-a găsit în comuna Felnac (r. Arad) pe loess și în comunele Periam și Sinpetru-Mare (r. Sînnicolau-Mare) pe marginea căii ferate și pe unele terenuri nisipoase.

Planta intră în alcătuirea mai multor fitocenoze. Pe terenurile lipsite de vegetație, pe nisipurile mobile, *Plantago indica* este o specie pionieră și alcătuiește asociații cu grad mic de acoperire. Pe măsură invaziei altor plante, acestea pot deveni dominante și în locul speciei de față. În locuri însoțite asociația cu *Plantago indica* are o durată de viață îndelungată, cum s-a constatat pe dunele de la Simian (r. Marghita).

Specia crește în asociațiile de *Cynodon dactylon*, *Carex stenophylla*, *Kochia laniflora*, *Anthemis ruthenica* ș. a.

Împreună cu aceste specii s-au mai găsit: *Potentilla arenaria*, *Poa bulbosa*, *Thymus glabrescens*, *Filago germanica*, *Sedum acre*, *Corynephorus canescens*, *Festuca vaginata*, *Festuca pallens*, *Scleranthus annuus*, *Centaurea arenaria*, *Crepis rhoeadifolia*, *Oenothera biennis*, *Helichrysum arenarium*, *Polygonum arenarium*, *Apera spica venti*, *Kochia prostrata* ș. a.

Din analiza sumară a condițiilor de viață și a fitocenzelor în care crește se vede că *Plantago indica* este o specie cu un areal variabil, în continuă extindere și restrângere, ceea ce face ca să fie aflată frecvent în unii ani sau să lipsească în alții. Chiar dacă se întâlnește în mai multe asociații vegetale, specia este totuși legată de condiții de uscăciune, unde lipsa unei concurențe prea mari permite existența sa.

7. *Plantago schwerzenbergiana* Schur. Specia amintită de Prodăna, fără localitate (11), este citată apoi tot de el din regiunea Crișana, Turnu și Chișineu-Criș (13). În *Flora R. P. R.* se notează prezența speciei în mai multe localități din regiunile Cluj, Galați, Bacău, Iași (5).

Noi am semnalat-o pentru prima dată din Banat în localitățile: Sînnicolau-Mare, Cenad, Bărăteaz, Saravale (r. Sînnicolau-Mare) și Peciu-Nou, Biniș (r. Reșița), Cebza (r. Deta), Dudeștii-Noi (r. Timișoara).

Plantago schwerzenbergiana este frecventă în asociația de *Atropis distans* din Banat. Mai rar se întâlnește și în asociația de *Hordeum hystrix*, pe soloneșuri solodizate, umede din primăvară și până la începutul verii, apoi se usucă. Suportă o cantitate mijlocie de săruri solubile și în special carbonat de sodiu.

În fitocenoză se mai află: *Pholiurus pannonicus*, *Festuca pseudovina*, *Juncus gerardi*, *Aster tripolium* ssp. *pannonicus*, *Camphorosma ovata*, *Lepidium ruderales*, *Atriplex litoralis*, *Statice gmelini*, *Artemisia maritima* var. *erecta*, *Matricaria chamomilla*, *Podospermum lacininatum*, *Rumex stenophyllus* ș. a.

8. *Geranium palustre* Torner. Planta nu este amintită din Banat (5). Specia s-a aflat la Domașnea (r. Orșova), în mlaștinile turboase formate în jurul izvoarelor de coastă din apropierea șoselei spre Caransebeș. Crește în asociație cu *Eriophorum latifolium*, *Carex flava*, *Carex leporina* ș. a.

9. *Secale montanum* Guss. Element balcanic, este cunoscută până în prezent numai din Bucegi (3). Planta a fost aflată pe Munții Domogled și Hurcu (Băile-Herculane), în păduri de fag în amestec cu specii termofile.

BIBLIOGRAFIE

1. ADAMOVIĆ L., *Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer*, Leipzig, 1909.
2. ASCHERSON P. u. GRAEBNER P., *Synopsis der Mittel-europäischen Flora*, Leipzig, 1930, 2, secția 1.
3. BELDIE AL., *Ocotirea naturii*, 1956, 2.
4. BORZA AL., *Conspectus Florae Romaniae — Regionumque affinium*, Cluj, 1947—1949.
5. * * * *Flora R.P.R.*, București, 1952—1962, 1—8.
6. * * * *Флора СССР*, Москва, 1949, 14.
7. HAYEK A., *Prodromus Florae peninsulae Balcanicae*, Berlin, 1931, 2.
8. HEGI G., *Illustrierte Flora von Mittel-Europa*, Viena, 1908—1931.
9. HEUFEL I., *Enumeratio Plantarum in Banatu Temesiensi sponte crescentium et frequentis culturam*, Viena, 1858.
10. OPREA C. V., CRIȘAN I., DRĂGAN I., OPRIS L. și POPESCU P., St. și cerc. șt., Acad. R.P.R., Baza Timișoara, 1957, 4, 1—2.
11. PRODAN I., Bul. Grăd. bot. și al Muz. bot. al Univ. Cluj, 1922, 2; 1923, 3.
12. — *Flora pentru determinarea plantelor ce cresc în România*, Cluj, 1939, 1—2.
13. — Bul. științ. Acad. R.P.R., Secția de biol. și șt. agr., 1956, 8, 1.
14. SCHUR FR., *Enumeratio plantarum Transsilvaniae*, Vindobonae, 1866.
15. СТОЯНОВ Н. и СТЕФАНОВ Б., *Флора на България*, София, 1925.
16. VELENOVSKY I., *Flora Bulgarica*, Praga, 1898.

Muzeul de științe naturale, Timișoara.

Primită în redacție la 16 august 1963.

PLANTE NOI ȘI RARE PENTRU FLORA MUNTENIEI

DE

A. POPESCU

581(05)

În lucrare sînt enumerate 17 unități sistematice de *Angiospermae* puțin răspîndite în țara noastră. Dintre acestea sînt semnalate ca noi pentru Muntenia, următoarele: *Montia verna*, *Hypericum montanum*, *Astragalus contortuplicatus*, *Vicia narbonensis*, *Peucedanum rochelianum*, *Kickxia elatine* var. *banatica*, *Heliotropium supinum*, *Galium tenuissimum*, *Valerianella costata*, *Asparagus verticillatus*. Celelalte 7 unități sistematice, *Dianthus pallens*, *Euphorbia agraria* var. *euboea*, *Galium divaricatum*, *Ornithogalum fimbriatum*, *Spiranthes spiralis*, ca și *Elymus asper* și *Phleum paniculatum* sînt în general rare pentru flora Munteniei.

În cele ce urmează prezentăm cîteva unități sistematice noi sau rare pentru flora Munteniei recoltate din regiunile Argeș și București.

Montia verna Neck. element circumpolar. D. G r e c e s c u o menționează de pe valea Cernei (8). În *Flora R.P.R.* (vol. I), este considerată dubioasă pentru țara noastră (6). G. B u j o r e a n și colaboratori au recoltat-o din mai multe localități din Banat (4).

În anul 1962 planta a fost găsită de noi la Pădurea Trivale (r. Pitesti), pe un teren folosit ca pășune, crescînd pe ridicăturile de sol produse de roțile căruțelor. În anii cu puține precipitații, planta este rară sau lipsește, ca să reapară abundant în anii în care solul are suficientă umezeală. Solul pe care crește planta, însoțită de *Agrostis tenuis*, *Lysimachia nummularia*, *Potentilla reptans*, *Trifolium repens* ș. a., este sărac și puternic podzolizat. Planta este nouă pentru Muntenia¹.

Dianthus pallens Sibth. et Sm., element sud-pontic xerofil, întîlnit îndeosebi în Dobrogea, citat de A. H a y e k (9), I. P r o d a n (12) ș. a. În

¹*Montia verna* a fost recoltată de I. Șerbanescu din mai multe localități (r. Tirgoviște), iar I. P o p o găsește lângă Băile 1 Mai (reg. Crișana) (ambele date din informații verbale).

Flora R.P.R. (vol. II), este menționat numai din puține localități (6). Din Muntenia, planta a fost recent publicată de V. Cioacărlan și C. Chirilă, care au găsit-o la Ulmeni (r. Oltenița) (5).

În vara anului 1962, planta a fost găsită de noi la Greaca (r. Oltenița), crescând pe locurile virane, printre viile de pe pantele dinspre baltă ale Stațiunii experimentale I.C.C.A., împreună cu *Linaria genistifolia*, *Glaucium corniculatum*, *Falcaria soides*, *Agropyron intermedium*.

Euphorbia agraria M. B. var. *euboca* (Hal.) Hay., element pontic cunoscut numai în câteva stațiuni din sudul țării: Dobrogea (Dealul Pricopanului) și Muntenia (Comana, r. Giurgiu) (6).

Am recoltat această plantă împreună cu specia tipică în mai multe stațiuni, atât în marginea șoselei, cât și pe terenurile necultivate de la Greaca, Căscioare, pădurea Măgura (r. Oltenița), însoțită adeseori de *Cephalaria transsilvanica*, *Pimpinella saxifraga*, *Andropogon ischaemum*, *Centaurea solstitialis* ș.a.

Hypericum montanum L., element central-european, citat de D. Grecescu din unele localități aflate în Oltenia (8), este dat în *Flora R.P.R.* (vol. IV) numai din nordul țării (6).

Date care să confirme prezența plantei și în Muntenia nu sînt. Noi am recoltat această plantă în pădurea Trivale (r. Pitești) la altitudinea de circa 340 m s. m. însoțită de *Poa nemoralis*, *Stellaria holostea*, *Polygonatum latifolium*, *Campanula rapunculoides*, *Lysimachia vulgaris*.

Astragalus contortuplicatus L., element continental, cunoscut pînă acum numai din Banat și Dobrogea (6). Adăugăm o nouă stațiune pentru Dobrogea, poalele Munților Măcin, unde planta crește pe sol nisipos-pietros aluvionar, ca și prima stațiune pentru Muntenia, aflată de noi la Greaca (r. Oltenița), crescînd, pe prundul bălții după retragerea apelor², în asociație cu *Potentilla supina*, *Juncus compressus*, *Kickxia elatine*, *Teucrium scordium* ș. a.

Vicia narbonensis L., element mediteranean, cunoscut pînă acum numai din Dobrogea (6), (8).

În vara anului 1962 am găsit această plantă la Greaca (r. Oltenița), crescînd în locurile necultivate din viile dinspre baltă ale Stațiunii experimentale I.C.C.A., în asociație cu *Linaria genistifolia*, *Torilis rubella*, *Aegilops cylindrica*, *Amarantus albus* ș. a. Planta este nouă pentru flora Munteniei.

Peucedanum rochelium Heuff., element dacic-iliric, endemic, este cunoscut pînă acum din Transilvania, Banat, Oltenia (6) și Moldova (12).

Această specie a fost găsită de noi în pădurea Trivale (r. Pitești), răspîdită în special pe valea Jienilor, crescînd împreună cu *Peucedanum oreoselinum*, *P. cervaria*, *Betonica officinalis*, *Calamagrostis epigeios* ș. a.

Planta este nouă pentru Muntenia. Materialul determinat de noi a fost confirmat ca atare de către acad. E. I. Nyárády.

² Recent (1962) această plantă a fost recoltată de către M. Andrei de pe malul lacului Brateș (reg. Galați) (din informații verbale).

Kickxia elatine (L.) Dum. var. *banatica* (Heuff.) Jáv., element mediteranean, cunoscut la noi pînă acum numai din Banat și Oltenia (6), (14). Această plantă am găsit-o frecvent răspîdită împreună cu specia




Fig. 1. — Răspîndirea citorva specii rare pe teritoriul Republicii Socialiste România (localitățile din Muntenia sînt identificate de autor).

tipică în împrejurimile bălții Greaca, și anume pe nisipurile rămase după retragerea apelor. Planta este nouă pentru flora Munteniei.

Heliotropium supinum L., element mediteranean, cunoscut pînă acum numai din regiunile Oltenia și Banat (6), (8).

Pînă în prezent, planta nu a fost semnalată din Muntenia. Menționăm că se găsește mult răspîdită în jurul bălții Greaca (r. Oltenița), crescînd împreună cu *Astragalus contortuplicatus*, *Kickxia elatine*, *Potentilla supina*, *Teucrium scordium* ș. a. pe prundișul rămas după retragerea apelor.

Galium tenuissimum M. B., element balcanic-continental cunoscut pînă nu demult din Banat, Transilvania și Oltenia (6), (8), a fost găsit recent de către C. Zahariadi și I. Tucra și în Dobrogea (20).

Pentru cunoașterea răspîndirii acestei plante în flora țării adăugăm prima stațiune pentru Muntenia, și anume Dealul Grebăn (com. Cocu-Popești, r. Vedea) unde este destul de abundentă, crescînd pe terenurile necultivate împreună cu *Delphinium consolida*, *Xeranthemum foetidum*, *Setaria glauca* ș. a.

***Galium divaricatum* Lam.**, element mediteranean, cunoscut în vestul țării din aceleași localități cu precedenta specie (6), (8), a fost găsită și în Muntenia (6), (17), pentru care noi adăugăm stațiunea de la Trivale (r. Pitești), în care planta crește în marginea pădurii, prin tufișurile răzlețe de *Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Acer tataricum*, *Rosa canina* ș. a.

***Valerianella costata* Stev.**, element mediteranean, cunoscut până acum numai din Dobrogea și Moldova de sud (6), a fost recoltat de noi la Trivale (r. Pitești), și anume în marginea pădurii crescând în locuri pietroase, puternic însoțite, împreună cu *Scleranthus perennis*, *Arenaria serpyllifolia*, *Herniaria glabra* ș.a. Planta este nouă pentru flora Munteniei.

***Ornithogalum fimbriatum* Willd.** plantă menționată de A. I. B o r z a din Oltenia, Muntenia și Dobrogea (1). I. P r o d a n o află la Pantonești (r. Fetești) (12), specificând că este rară pentru țara noastră.

În aprilie 1962 am găsit-o la Comana (r. Giurgiu), la marginea pădurii, de-a lungul șoselei spre Mihai Bravu, în același loc cu *Ornithogalum umbellatum*³.

***Asparagus verticillatus* L.** este cunoscută până acum numai din Dobrogea, fiind menționată de D. G r e c e s c u (8), A. H a y e k (9).

Această plantă a fost găsită de noi la Greaca (r. Oltenița), prin tufișurile dinspre pădurea Măgura și prin mărăcinișurile din jurul bălții. Planta este nouă pentru flora Munteniei.

***Spiranthes spiralis* (L.) Kevall**, element altaic, cunoscut de D. G r e c e s c u din regiunea Pitești (8), a fost semnalat apoi de Z. P a n ț u în regiunile Oltenia și Ploiești (10). Din Transilvania este citat de M. F u s s (7), L. S i m o n k a i (15), M. Ș e r b a n (16) și R. S o ó (13).

Această mică *Orchidaceae* a fost găsită de noi (1962) pe Dealul Mare (com. Cocu-Popești, r. Vedea), crescând în puține exemplare, într-o poeniță umedă în locul zis „Cotul-lui-Cercel”. În urma invadării acestei stațiuni cu *Populus tremula*, planta nu a mai fost regăsită.

Dintre *Gramineae*, nu prea frecvent întâlnite, menționăm:

***Elymus asper* (Simk.) Hand. Maz.** găsit pe Dealul Grebăn (com. Cocu-Popești, r. Vedea).

***Phleum paniculatum* Huds.** la Greaca (r. Oltenița), pe cărările din viile Stațiunii experimentale I.C.C.A.

Prin această notă aducem o contribuție la cunoașterea răspândirii unor specii noi sau rare pentru flora angiospermelor din sudul țării.

Pentru concursul acordat în efectuarea acestei lucrări, ținem să mulțumim și pe această cale prof. Traian I. Ștefureac.

BIBLIOGRAFIE

1. BORZA AL., *Conspectus Florae Romaniae — Regionumque Affinium*, Cluj, 1947—1949.
2. — Contribuții Botanice, Cluj, 1958.
3. BUIA AL., *Ocrotirea Naturii*, 1959, 4.

³ C. Zahariadi a găsit această plantă la Greaca (r. Oltenița) (din informații verbale).

4. BUJOREAN G., GRIGORE S., OPRIN C., POPESCU P. C. și POPESCU V., St. și cerc. șt. agric., Acad. R.P.R., Baza Timișoara, 1959, 7, 3—4.
5. CIOCIRLAN V. și CHIRILĂ C., Lucr. șt. Inst. agronom. „N. Bălcescu”, București, 1960.
6. * * * *Flora R.P.R.*, București, 1952—1962, 1—8.
7. FUSS M., *Flora Transsilvaniae Excursoria*, Cibinii, 1866.
8. GRECESCU D., *Conspectul Florei României*, București, 1898—1909.
9. HAYEK A., *Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae*, Berlin, 1927—1933, 1—3.
10. PANTU Z., *Orchidaceele din România*, București, 1915.
11. PRODAN I., *Flora pentru determinarea și descrierea plantelor ce cresc în România*, Cluj, 1939.
12. — Bul. șt., Sect. biol. și șt. agric., Seria botanică, Acad. R.P.R., Filiala Cluj, 1957, 4.
13. Soó R., *Annales biologicae Universitatis Debreceniensis*, 1950, 1.
14. SORAN V., St. și cerc. șt., Acad. R.P.R., Filiala Cluj, 1954, 1—2.
15. SIMONKAI L., *Flora Transsilvaniae Vesculosae Critica*, Budapesta, 1886.
16. ȘERBAN M., Bul. Grăd. bot. și al Muz. bot. Univ. Cluj, 1938, 18.
17. ȘERBĂNESCU I., Lucr. Grăd. bot., București, volum festiv, dedicat Centenarului Grăd. bot. din București, 1963.
18. ȘERBĂNESCU M., Bull. de la Sec. Sci. de l'Acad. Roum., 1943, 25, 10.
19. TODOR I., *Note la Gramineele și Leguminoasele din R.P.R., Centuria I-a*, București, 1959.
20. ZAHARIADI C. și ȚUCRA I., Com. Acad. R.P.R., 1963, 13, 4.

Facultatea de biologie, Catedra de botanică.

Primită în redacție la 14 mai 1964.

CONTRIBUȚII LA FLORA DOBROGII

DE

V. ZANOSCHI, M. TOMA și GH. VIȚELARU

581(05)

Autorii citează speciile *Genista trifoliata* Jka. și *Phleum subulatum* A.u.G. ca noi pentru teritoriul Republicii Socialiste România și câteva unități sistematice noi sau rare pentru flora Dobrogi.

În această lucrare cităm 11 taxoane de *Angiospermae* din Dobrogea de sud, din care două specii sînt noi pentru teritoriul țării o specie, o varietate, o formă și o subformă sînt necitate din Dobrogea, iar restul sînt rare pentru flora acestei regiuni, fiind indicate din puține stațiuni.

1. *Genista trifoliata* Jka., in OBZ, XXIII (1873), 243. *G. trifoliata* var. *romanica* Prod., in Bul. Grăd. bot. și al Muz. bot. Univ. Cluj, V (1925), 39. *G. romanica* Prod., Fl., II (1939), 506.

I. P r o d a n în 1925 (9) și 1939 (10) descrie această plantă din regiunea cuprinsă între Durankulak și Ecrene (R. P. Bulgaria). A l. B o r z a (2) indică fără localitate această plantă din Dobrogea, iar în *Flora R. P. R.* (4) se arată că „prezența plantei în țara noastră este nesigură”.

Noi am aflat specia *Genista trifoliata* Jka. în pădurea Hagieni (r. Ne-gru-Vodă), la 7.VII.1963.

Planta vegetează în tufe viguroase pe coaste abrupte, pietroase, cu expoziție sud-vestică, înclinare circa 35° și pe locuri plane, puternic înierbate, împreună cu următoarele specii: *Koeleria gracilis* Pers., *Stipa capitata* L., *Agropyron cristatum* (L.) Gaertn., *Teucrium polium* L., *Teucrium chamaedrys* L., *Filipendula hexapetala* Gilib., *Paeonia tenuifolia* L., *Onosma visianii* Clem., *Althaea hirsuta* L., *Centaurea diffusa* Lam., *Crapina vulgaris* Pers., *Eryngium campestre* L., *Xeranthemum annuum* L., *Jasminum fruticans* L., *Thymelaea passerina* (L.) Coss., *Paliurus spina christi* Mill., *Carpinus orientalis* Mill. ș. a.

2. *Phleum subulatum* A. u. G., Syn., II, 154 (1899). *Phalaris subulata* Savi, Fl. Pis., I, 57 (1798). *Phleum tenue* Schrad., Fl. Germ., I (1806),

161; Griseb. in Ldb., Fl. Ross., IV, 455; Smalig., Fl., II, 601. *Phl. tenue* Trin., Fund. Agrost. (1820), 127. *Achnodonton tenuis* P. B., Agrost. (1821), 146.

E. I. Nyárady (7) și I. Prodan (11) citează această plantă din R. P. Bulgaria, pe stînci, la Capul Caliacra, iar A. I. Borza (2), bazat probabil pe aceste date, o indică fără localitate din Dobrogea; pînă acum nu a fost aflată pe teritoriul țării.

Noi am găsit această specie la 7. VII. 1963 în perdeaua de protecție și pe marginea drumului care duce din Mangalia la satul Limanu.

Phleum subulatum A. u. G. este plantă anuală cu numeroase tulpini subțiri, tari, netede \pm ascendente, erecte, înalte de 2—3 (rareori pînă la 4) dm. Frunze îngust liniare, pe margini aspre. Ligula alungită. Panicula alungit-cilindrică, la bază rotunjită, de culoare verde-vînată. Glumele spiculețului cu un vîrf scurt, pe partea dorsală sînt curbate în interior, cu trei nervuri pronunțate, depărtate, pe carenă glabre. Glumele sînt de două ori mai lungi decît paleele și membranoase între nervuri și pe margini. Paleele sînt membranoase, aproape egale, ovoide, cu cinci nervuri. Paleea inferioară la capete este dințat retezată. V—VI (fig. 1).

În cuprinsul ariei generale planta aceasta crește prin locuri ierboase uscate, pe coline, arături, în vii, pe locuri pietroase, în locurile care au fost inundate. Noi am găsit-o în locurile pietroase și bătătorite de la marginea drumului, în asociație cu *Cynodon dactylon* (L.) Pers., *Aegilops cylindrica* Host., *Hordeum murinum* L., *Agropyron repens* (L.) Pall., *Lolium perenne* L., *Bromus mollis* L., *Centaurea diffusa* Lam., *Cichorium intybus* L., *Scolymus hispanicus* L., *Xanthium spinosum* L., *Centaurea calcitrapa* Lam., *Erodium cicutarium* (L.) L'Herit., *Echium italicum* L., *Asperula humifusa*

Bess., *Marrubium peregrinum* L., *Plantago lanceolata* L., *Buffonia tenuifolia* L. ș. a.

Răspîndirea generală: în regiunea mediteraneană, Peninsula Balcanică și Asia Mică.




Fig. 1. — *Phleum subulatum* A. u. G.
a, Porțiune din tulpină cu panicul;
b, spiculeț; c, paleile.

3. *Lathyrus sphaericus* Retz. Am colectat această plantă la 8. VI. 1963, în pădurea Canaraua Fetei, satul Cărpiniș și pădurea Mișelic—Carvăn (r. Adamclisi) din ochiuri defrișate. Nouă pentru Dobrogea.

4. *Quercus pedunculiflora* C. Koch var. *atrachoclados* (Borb. et Bornn.) Schwz. f. *typica* Schwz. subf. *obtusiloba* Schwz. O cităm din pădurea Moara Pașei, satul Răzoarele (r. Adamclisi); var. f. și subf. noi pentru Dobrogea.

5. *Acer campestre* L. ssp. *marsicum* (Guss.) Hay. var. *subtrilobum* (Ueteh. et Sint) Beldie. Plantă cunoscută în Dobrogea de la Murfatlar și Babadag. Noi am găsit-o în pădurea Moara Pașei, satul Răzoarele (r. Adamclisi).

6. *Cytisus leucotrichus* Schur. Citată în Dobrogea numai de la Cernavodă. Crește și la marginea pădurii Canaraua Fetei.

7. *Ononis columnae* All. Plantă destul de rară în flora țării. Citată în Dobrogea de nord (4) și de la Murfatlar (3). O semnalăm și din pădurea Hagieni (r. Negru-Vodă).

8. *Caragana frutex* (L.) K. Koch. Planta a mai fost citată din fața stației Mircea-Vodă, la sud-est de Cochirleni (4) și pe valea Omurcea (6) (r. Medgidia). Crește și la marginea pădurii Canaraua Fetei, satul Cărpiniș (r. Adamclisi).

9. *Astragalus spruneri* Boiss. Plantă foarte rară în flora țării, cunoscută pînă în prezent numai de la Mangalia deasupra izvorului termal (4). Crește și în pădurea Hagieni (r. Negru-Vodă).

10. *Bupleurum praecaltum* Nathh. var. *wettsteinianum* H. Wolff. Citată în Dobrogea numai de la Babadag și Izvoarele pe Dealul Consul (r. Tulcea) (4), (12). Crește și în pădurea Canaraua Fetei.

11. *Laser trilobum* (L.) Borkh. Indicată în Dobrogea numai din nord. O cităm și din Dobrogea de sud din pădurile Hagieni, Canaraua Fetei și Mișelic—Carvăn.

Plantele care fac obiectul prezentei lucrări sînt depuse în ierbarul Institutului de biologie „Traian Săvulescu” București.

BIBLIOGRAFIE

1. ASCHERSON P. u. GRAEBNER P., *Synopsis der mitteleuropäischen Flora*, Leipzig, 1898—1902, I.
2. BORZA AL., *Conspectus Florae Romaniae—Regionumque Affinium*, Cluj, 1947—1949.
3. DIHORU GH. și SANDA V., *Com. Acad. R.P.R.*, 1962, 12, 11.
4. * * * *Flora R.P.R.*, București, 1952, 1; 1957, 5; 1958, 6.
5. * * * *Флора СССР*. Ленинград 1934, II.
6. LUPE I. Z., *Com. Acad. R.P.R.*, 1961, 11, 12.
7. NYÁRÁDY E. I., *Bul. Grăd. bot. și al Muz. bot. Univ. Cluj*, 1931, 11.
8. — *Despre flora și vegetația nisipărilor litoralului nostru dintre Capul Midia și Costinești*, în *Omagiu lui Traian Săvulescu*, București, 1959, 537—561.
9. PRODAN I., *Bul. Inform. Muz. Bot. Cluj*, 1925, 5.
10. — *Flora pentru determinarea și descrierea plantelor ce cresc în România*, Cluj, 1939.
11. — *Bul. Acad. de Înalte studii agronomice*, Cluj, 1934, 5; 1935, 6; 1938, 7.
12. RAȚIU O., GERGELY I. și SILAGHI GH., *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Biologia*, 1961, 2.
13. СТОЯНОВ Н. и СТЕФАНОВ Б., *Флора на България*, София, 1948.
14. ZAHARIADI C. și TUCRA I., *Com. Acad. R.P.R.*, 1963, 13, 4.

Institutul agronomic Iași, Catedra de botanică.

Primită în redacție la 21 noiembrie 1963.

CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA BRIOFLOREI PĂDURII HOIA — CLUJ

DE

E. PLĂMADĂ

581(05)

Între anii 1961 și 1963 a fost cercetată brioflora pădurii Hoia din apropierea orașului Cluj. Au fost identificate 50 de taxoane din care 25 sînt noi pentru această pădure, respectiv unele pentru împrejurimile Clujului sau chiar pentru brioflora Transilvaniei.

Studii asupra florei briologice din împrejurimile Clujului au fost făcute de: M. Péterfi, I. Györfy, C. Papp și A. Boros. Din pădurea Hoia, care se află în partea nord-vestică a orașului Cluj, pe Dealu Hoia din imediata apropiere a văii Someșului Mic, sînt semnalate de A. Boros un număr de 35 de unități sistematice, dintre care o singură hepatică (1).

Prin prelucrarea materialului adunat de noi între anii 1961 și 1963 din pădurea Hoia am identificat un număr de 50 de unități sistematice aparținînd la 20 de familii, 32 de genuri, 43 de specii și 7 varietăți și forme, dintre care 3 specii sînt hepatice¹. Un număr de 25 de unități sistematice sînt noi pentru această pădure (+), dintre care unele pentru împrejurimile Clujului și chiar pentru Transilvania.

Incluzînd și briofitele din această pădure, cunoscute pînă acum (1), notate în text (!), prezenta contribuție cuprinde un total de 63 de unități sistematice, aparținînd la 22 de familii, 41 de genuri, 56 de specii și 8 varietăți și forme.

Pădurea Hoia, aflîndu-se pe culmile unor dealuri bătute de vînt și fiind lipsită de piraie și văi umede, este mai secetoasă și, ca atare, una dintre cele mai sărace în mușchi din împrejurimile Clujului. Față de Gră-

¹ Materialul critic a fost verificat de către Tr. I. Ștefureac din București, C. Papp și Gh. Mihail din Iași, cărora le aducem mulțumiri și pe această cale.

dina botanică din Cluj, de exemplu, cu o suprafață de numai 14 ha, numărul de specii din această pădure (cu 126 ha) este aproape jumătate.

CL. HEPATICAEE

Fam. METZGERIACEAE

+ *Metzgeria furcata* (L.) Lindb. var. *pinnata* Dum., T.C.²

Fam. LOPHOCOLEACEAE

+ *Lophocolea heterophylla* (Schrad.) Dum., L.

Fam. RADULACEAE

Radula complanata (L.) Dum., C.

CL. MUSCI

Fam. POLYTRICHACEAE

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv., T.

Polytrichum formosum Hedw., T.

P. juniperinum Willd., T.

Fam. FISSIDENTACEAE

+ *Fissidens pusillus* Wils. var. *fallax* Limpr., S.

Fam. DITRICHACEAE

+ *Ceratodon purpureus* (L.) Brid., T.

Fam. DICRANACEAE

+ *Dicranella heteromalla* (Hedw.) Schimp. var. *heteromalla*, T.

! *Anisothecium varium* (Hedw.) Mitten

+ *Dicranum scoparium* (L.) Hedw., C.

Fam. POTTIACEAE

! *Hymenostomum microstomum* (Hedw.) R. Brown.

! *Barbula fallax* Hedw.

! *Tortula muralis* (L.) Hedw.

! *Syntrichia pulvinata* Jur. f. *microphylla* Warnst.

! *Acaulon triquetrum* (Spruce) C. Müller

²C. = Corticol; L. = lemn putred; S. = saxicol; T. = tericol; + = specii noi pentru teritoriul cercetat; ! = specii luate din literatura de specialitate.

Fam. BRYACEAE

! *Bryum caespitium* L.

B. capillare Hedw., L. + var. *flaccidum* Br. eur., C.

B. argenteum L., T.

Fam. MNIACEAE

Mnium cuspidatum (L.) Hedw., T. L.

M. undulatum (L.) Hedw., T.

Fam. ORTHOTRICHACEAE

! *Orthotrichum affine* Schrad., C.

Fam. LEUCODONTACEAE

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwagr., C.

Fam. NECKERACEAE

+ *Homalia trichomanoides* (Schreb.) Br. eur., C.L.

Fam. LEMBOPHYLLACEAE

+ *Isoetecium myurum* (Pollich.) Brid. var. *longicuspis* Schiffner, L. Subunitatea este nouă pentru flora briologică a Transilvaniei.

Fam. LESKEACEAE

Anomodon viticulosus (L.) Hook. et Tayl., C.

+ *A. attenuatus* (Hedw.) Hüb., C.

! *A. longifolius* (Schleich.) Bruch., C.

Leskea polycarpa Ehrh., C.

Leskeella nervosa (Brid.) Loeske, C.

Fam. THUIDIACEAE

Thuidium abietinum Br. eur., T.

+ *T. philiberti* Limpr., T.

Fam. AMBLYSTEGIACEAE

! *Campylium chrysophyllum* (Brid.) Bryhn.

Amblystegium serpens (Hedw.) Br. eur., C.

A. juratzkanum Schimper, + f. *longifolium* Podp., C. (leg. E. Vicol). Subunitatea este nouă pentru brioflora Transilvaniei.

+ *A. varium* (Hedw.) Lindb., L.

! *Amblystegiella subtilis* (Hedw.) Loeske

Fam. BRACHYTHECIACEAE

Camptothecium lutescens (Hedw.) Br. eur., T.

+ *Brachythecium salebrosum* (Hoffm.) Br. eur., C.

+ f. *sericeum* Warnst., C.T. Subunitatea este nouă pentru împrejurimile Clujului.

- + *B. mildeanum* Schimp., T.L.
 ! *B. rutabulum* (Hedw.) Br. eur.
B. velutinum (L.) Br. eur. + var. *praelongum* Br. eur., C. Subunitatea este nouă pentru împrejurimile Clujului.
Scleropodium purum (L.) Limpr., T.
 + *Cirriphyllum velutinoides* (Bruch.) Loeske et Fleischer, S. Este o specie nouă pentru împrejurimile Clujului.
Eurhynchium swartzii (Turn.) Hobk., T. + var. *abbreviatum* Turn., T.
 + *Rhynchostegella tenella* (Dickson) Limpr. f. *meridionalis* (Brizi) Podp., C. (det. G. h. Mihai). Subunitatea este nouă pentru flora briologică a Transilvaniei.

Fam. ENTODONTACEAE

Pleurozium schreberi (Willd.) Mitten, T.

Fam. PLAGIOTHECIACEAE

- Plagiothecium denticulatum* (Hedw.) Br. eur., T.
 + *P. neglectum* Moenkem., T.
 ! *P. roeseanum* (Hampe) Br. eur.

Fam. HYPNACEAE

- + *Pylaisia polyantha* (Hedw.) Br. eur., C.
 + *Homomalium incurvatum* (Brid.) Loeske, C.
Hypnum cupressiforme L. Pe toate suporturile.
 + var. *filiforme* Brid., C.
 + var. *resupinatum* Schimper, C. Subunitate nouă pentru împrejurimile Clujului.

Fam. RHYTIDIACEAE

- Rhytidium rugosum* (Ehrh.) Kindb., T.
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst., T.

BIBLIOGRAFIE

1. BOROS A., Acta Bot. Sci. Hung., 1958, 4, 1—2, 1—17.
2. — Scripta Bot. Mus. Transs., 1942, 1, 30.
3. GYÖRFFY I., Magy. Bot. Lapok, 1903, 2, 146.
4. — Magy. Bot. Lapok, 1909, 8, 51.
5. — Folia Cryptog., 1924, 1, 1, 25.
6. PÁLL ST., Studia Univ. „Babeş-Bolyai”, 1960, seria aII-a, 2, 89.
7. PAPP C., Bul. Grăd. bot. și al Muz. bot. Univ. Cluj, 1940, 20, 3—4, 116.
8. — Rev. št. „V. Adamachi”, Iași, 1946, 32, 4, 263.
9. PÉTERFI M., Magy. Bot. Lapok, 1903, 2, 288.
10. PODPERA J., *Conspectus Muscorum Europaeorum*, Praga, 1954.
11. ȘTEFUREAC TR. I., Bul. Grăd. bot. și al Muz. bot. Univ. Cluj, 1942, 22, 1—4, 1.
12. — Bul. Grăd. bot. și al Muz. bot. Univ. Cluj, 1945, 25, 173.

Centrul de cercetări biologice, Cluj,
 Sectorul de sistematică.

Primită în redacție la 15 martie 1965.

NOI ALGE PENTRU FLORA ROMÂNIEI

DE

L. GRUIA

581(05)

Lucrarea prezintă 10 unități sistematice de alge noi pentru flora României dintre care 7 *Cyanophyceae* și 3 *Bacillariophyceae*. Dintre acestea, *Eucapsis minor* F. E. Fritsch aparține unui gen nou pentru țara noastră. Sînt citate cîteva caracteristici ale mediului în care au fost găsite algele menționate. Dintre algele citate, șapte sînt acvatiche, una a fost găsită pe pietre la semiîntineric și două au fost determinate din culturi de alge din sol.

În această lucrare facem cunoscute un număr de 10 unități sistematice de alge noi pentru flora țării noastre, dintre care 8 specii și 2 forme, alge determinate din rezervația naturală „Arinișul de la Sinaia”; culturi de alge din solurile brun-deschis de stepă aridă și cernoziom levigat; rîul Trotuș, probe colectate din următoarele stații:

Stația 1. Rezervația naturală „Arinișul de la Sinaia”.

A, 27.V.1961; temperatura apei = 10,4°C; pH-ul = 6,8—7;

a, mici bălți cu apă stagnantă;

b, apă foarte slab curgătoare, provenită din pîrîul central al rezervației;

c, de la 1—4 cm adîncime din apă curgătoare, pîrîul central al rezervației;

B, 28.V.1961; temperatura apei = 9,1°C; pH-ul = 6,8—7. De pe pietre din semiîntineric acoperite cu un strat pelicular de apă provenită din pîrîul sudic al rezervației.

Stația 2. Cultură de alge din sol brun-deschis de stepă aridă, colectat la 5.VII. 1962 din nordul localității Cernavodă. Adîncime = 10 cm. pH = 6,6. Textură = nisipo-lutoasă. Altitudine = 100 m s. m. Vegetație = cultură de porumb.

Stația 3. Cultură de alge din sol cernoziom levigat, colectat la 13.IX.1962 de la Stațiunea I.C.C.A. Fundulea. pH = 6,8. Textură = nisipo-

lutoasă-luto-nisipoasă. Altitudine = 70 m s.m. Vegetație = cultură de porumb.

A, De la 10 cm adâncime;

B, de la 0–2 mm adâncime.

Stația 4. Rîul Trotuș la Adjud, 1.X.1959 (leg. S. Marcoci). Temperatura apei = 15°C. pH = 7,3–7,8. Oxigen solvit = 10,67 mg/l¹.

În probele colectate din stațiile menționate mai sus sau în culturile de alge din solurile citate, pe lângă alte alge, am determinat și următoarele unități sistematice noi pentru flora țării noastre:

CYANOPHYTA

Gloeocapsa vacuolata (Skuja) Hollerb.
(= *Chroococcus vacuolatus* Skuja)

(Pl. I, fig. 1)

Specie care se caracterizează, după cum o arată și numele, prin prezența unei vacuole destul de mari în materialul analizat și dispusă central în celulă.

Citată din lunci, la început în bentos, apoi prin dezvoltarea vacuolei, în plancton.

Răspândită insular în Europa.

Rar întâlnită în proba colectată din stația 1Aa și foarte rar în proba colectată din stația 1Ab.

Eucapsis minor F. E. Fritsch

(Pl. I, fig. 2)

În materialul analizat celulele sferice aveau 1,8–2,3 μ în diametru.

Citată din planctonul de iarnă al lacurilor.

Răspândită în Europa și Siberia de vest. Gen necunoscut pînă acum în țara noastră.

Foarte rar întâlnită în proba colectată din stația 1Ac.

Oscillatoria limnetica Lemm. f. *acicularis* (Nyg.) V. Poljansk.
(= *O. limnetica* Lemm. var. *acicularis* Nyg.)

(Pl. I, fig. 3)

Formă citată din ape stagnante.

Puțin răspândită în Europa (Danemarca).

Rar întâlnită în proba colectată din stația 1Aa.

¹ Probele din rîul Trotuș, ca și datele fizico-chimice ne-au fost puse la dispoziție de S. Marcoci (I.S.C.H.), pentru care și pe această cale îi aducem sincerele noastre mulțumiri.

PLANȘA I




Fig. 1. — *Gloeocapsa vacuolata* (Skuja) Hollerb. (original). Fig. 2. — *Eucapsis minor* F. E. Fritsch (original). Fig. 3. — *Oscillatoria limnetica* Lemm. f. *acicularis* (Nyg.) V. Poljansk. (original). Fig. 4. — *Phormidium henningssii* Lemm. (original). Fig. 5. — *Phormidium papillaterminatum* Kissel. (original). Fig. 6. — *Phormidium lividum* Næg. (original). Fig. 7. — *Plectonema radiosum* (Schiederm.) Gom. (original). Fig. 8. — *Synedra ulna* (Nitzsch) Ehr. var. *oxyrhynchus* (Kütz.) V. H. f. *mediocontracta* Forti (original). Fig. 9. — *Gomphonema tergestinum* (Grun.) Fricke (original). Fig. 10. — *Gomphonema clavellum* Fricke (original).

Phormidium henningsii Lemm.

(Pl. I, fig. 4)

În materialul analizat este demnă de remarcat prezența în jurul trichomilor a unei teci gelatinoase incolore, subțiri greu vizibile.

Citată din ape stătătoare, de pe stînci, umede, de pe *Sphagnum* în sere.

Relativ puțin răspîndită în Europa, Caucaz.

Determinată în culturile probelor din stațiile 2 și 3 A.

Phormidium papillaterminatum Kissel.

(Pl. I, fig. 5)

Specie citată din ape dulci și sărate.

Răspîndită în Asia centrală (Marea Aral, lacul Isik-kul mici lacuri pe lângă fluviul Sir-Daria).

Relativ rar întîlnită în proba colectată din stația 1Aa.

Phormidium lividum Näg.(=*Lyngbya livida* Hansg.)

(Pl. I, fig. 6)

În materialul analizat am întîlnit faptul, demn de remarcat că unii trichomi aveau celula terminală îngroșată, lucru nementionat în literatura de specialitate.

Specie citată de pe sol și stînci umede.

Răspîndită în Europa (Elveția, Austria, R. S. Cehoslovacă).

Determinată în cultura probei colectate din stația 3B.

Plectonema radiosum (Schiederm.) Gom.

(Pl. I, fig. 7)

În materialul analizat filamentele aveau 12,2—13,4 μ lățime, iar trichomii 8,9—9,8 μ lățime formați din celule de 2,4—4,2 μ lungime.

Specie de ape reci (izvoare, pîraie).

Răspîndită insular în Europa (Austria) și Africa de nord (Alger).

Relativ rar întîlnită în proba colectată din stația 1B.

BACILLARIOPHYTA**Synedra ulna** (Nitzsch) Ehr. var. **oxyrhynchus** (Kütz.) V. H. f. **mediocontracta** Forti

(Pl. I, fig. 8)

Se deosebește de var. *oxyrhynchus* (Kütz.) V. H. prin strangularea căsuței în porțiunea mediană.

Foarte rar întîlnită în proba colectată din stația 1Ac.

Gomphonema tergestinum (Grun.) Fricke

(Pl. I, fig. 9)

Se caracterizează prin aria longitudinală foarte îngustă și aria centrală dezvoltată unilateral, cu un singur punct central.

Specie de ape dulci stătătoare sau curgătoare.

Citată din Europa, Asia (?).

Foarte rar întîlnită în proba colectată din stația 4.

Gomphonema clevei Fricke

(Pl. I, fig. 10)

Se caracterizează prin aria centrală asimetrică și fără punctuațiuni.

Specie citată din ape dulci.

Pînă acum determinată numai din Asia și Africa.

Relativ rar întîlnită în proba colectată din stația 4.

BIBLIOGRAFIE

1. ELENKIN A. A., *Monographia algarum Cyanophycearum aquidulcium et terrestrium in finibus URSS inventarum*, Sumpt. Acad. Scient. U.R.S.S., Mosqua-Leningrad, 1949, 2, pars specialis.
2. GEITLER L., *Cyanophyceae*, in PASCHER A., *Die Süßwasser-Flora*, Jena, 1925, 12.
3. GRUIA LUCIAN, Anal. Univ. Buc., seria št. nat., 1961, 28, 105—116.
4. — St. și cerc. biol., Seria biol. veget., 1961, 13, 4, 539—545.
5. — Com. Acad. R.P.R., 1962, 12, 2, 225—230.
6. — St. și cerc. biol., Seria biol. veget., 1962, 14, 3, 325—336.
7. — Com. Acad. R.P.R., 1962, 12, 10, 1 131—1 136.
8. — Com. Acad. R.P.R., 1963, 13, 1, 45—51.
9. — Com. Acad. R.P.R., 1963, 13, 7, 619—628.
10. ХОЛЛЕРБАХ М. М., КОСИНСКАЯ Е. К. и ПОЛЯНСКИ В. И., *Синезеленые водоросли в Определитель пресноводных водорослей СССР*, Советская наука, Москва, 1953, 2.
11. MORUZI CONSTANȚA, VASILIU A. GH. și STROIE-IANCU MARIA, St. și cerc. I.C.P., 1960, 2, V, 131—179.
12. MORUZI CONSTANȚA și DIACONESCU VALERIA, Anal. Univ. Buc., seria št. nat., 1961, 28, 35—51.
13. OLTEAN MIRCEA, St. și cerc. biol., Seria biol. veget., 1960, 12, 4, 445—459.
14. OLTEAN MIRCEA și ZANOSCHI V., St. și cerc. biol., Seria biol. veget., 1962, 14, 4, 423—428.
15. PALIK P., St. și cerc. biol., Seria biol. veget., 1960, 12, 1, 35—51.
16. PÉTERFI ȘTEFAN, Contribuții Botanice, Univ. „V. Babeș”, Cluj, 1958, 31—44.
17. ȘERBĂNESCU MARIA și ȘERBĂNESCU I., St. și cerc. biol., Seria biol. veget., 1958, 10, 1, 55—85.
18. ȘERBĂNESCU MARIA, Acta Bot. Horti Bucurestiensis 1960, București, 1961, 215—235.
19. ȘERBĂNESCU MARIA și DECU VASILE, Rev. de Biol., 1962, 7, 2, 201—214.
20. TARNAVSCI I. T. și OLTEAN M., Anal. Univ. Buc., seria št. nat., 1956, 12, 97—149.
21. — St. și cerc. biol., Seria biol. veget., 1958, 10, 3—4.
22. ЗАВЕЛИНА М. М., КИССЕЛЕВ И. А., ПРОШКИНА-ЛАВРЕНКО А. И. и ШЕШУКОВА В. С., *Диатомовые водоросли, в Определитель пресноводных водорослей СССР*, Советская наука, Москва, 1951, 4.

Stațiunea zoologică, Sinaia, Laboratorul de algologie.

Primită în redacție la 2 decembrie 1963.

CÎTEVA DATE PRIVIND EFECTUL ÎNTINDERII MECANICE ASUPRA MIȘCĂRII PROTOPLASMATICE*

DE

ACADEMICIAN EMIL POP,

VIOREL SORAN și MIRCEA ȘTIRBAN

581 (05)

Utilizând un dispozitiv aplicabil la microscop, s-a urmărit efectul forței mecanice de întindere a celulei și deci a plasmei asupra mișcărilor plasmatice. Drept test au servit fragmente de epidermă superioară a solzilor de ceapă (*Allium cepa*).

Se dovedește că prin întinderea mecanică experimentală a plasmei mișcările se accelerează cu condiția ca întinderea să nu depășească limita fiziologică. Se pune în evidență importanța rezistenței diferite a membranelor celulare ca factori care intervin în rezultate.

Raportul dintre starea de întindere fizică a protoplasmei și mișcarea acesteia a fost susținut de unul din autori încă de mult pe baza unor extinse cercetări statistice la diferite tipuri de dermatoplaste (7), (8). Pentru a-l confirma cantitativ și în mod experimental s-au efectuat diferite categorii de cercetări. Una dintre acestea a constat din urmărirea vitezei mișcărilor la celule din ce în ce mai lungi din vârful vegetativ al rădăcinii cu justa presupunere că, în celulele progresiv alungite prin creștere, protoplasma este și ea din ce în ce mai întinsă (7), (9), (11), (15). De la început s-a exprimat însă bănuiala că, în zona de creștere prin întindere care ne-a servit ca obiect de cercetare, dineză poate fi influențată și de alți factori în afară de întinderea progresivă a plasmei (9), (11). Această bănuială s-a confirmat în mod convingător prin cercetările făcute asupra celulelor rizodermale din radícula de orz, care au atestat realitatea raportului dintre viteza mișcărilor plasmatice și lungimea celulelor, raport ce s-a dovedit însă inegal din cauza intervenției configurației citologice și a proceselor metabolice care au evoluat și ele în mod activ în cursul creșterii (9), (11).

* Lucrare publicată și în „Revue roumaine de Biologie — Série de Botanique”, 1965, 10, 6, p. 469 (în limba engleză).

Această situație sugerează cercetătorului să urmărească raportul menționat în incinta aceleiași celule, în care să coexiste în mod normal sau prin intervenții experimentale porțiuni de plasmă cu diferite grade de întindere. Astfel de stare, fiziologică normală, găsim în celulele crescute, a căror plasmă este parte parietală, parte răsfirată în cordoane intravacuolare, de regulă mai întinse decât tapetul plasmatic. Studiul comparativ al vitezei mișcărilor din cele două porțiuni diferite de plasmă din celulele vaginale de *Ruppia* a arătat într-adevăr o viteză relativ mărită în cordoane față de cea din plasma parietală (8).

Porțiuni plasmatice de diferite grade de întindere din cuprinsul aceleiași celule pot fi provocate și experimental prin plasmoliză concavă: plasma, alipită încă de membrană, este mai contractată, iar cea de pe concavitate mult mai întinsă. Sintem în drept să admitem că procesele variabile intracelulare care secondează plasmoliza progresivă — deshidratarea, viscozitatea, metabolismul — (5), (6), (17) afectează în acest caz întreg protoplastul în mod uniform, iar cele două porțiuni plasmatice, parietală și de pe concavitate, se deosebesc în fond prin stările lor de întindere. Măsurând vitezele dizei din cele două porțiuni de plasmă ale aceluiași celule și interpretând statistic rezultatele, s-au pus în evidență viteze remarcabil mai mari în plasma concavităților (8).

De astă dată ne-am hotărât să extindem documentarea la un țesut ale cărui celule să fie întinse în mod experimental prin aplicarea unei forțe mecanice de tracțiune, măsurând viteza mișcărilor înainte și de după întinderea țesutului. De la început ne-am propus să încercăm a întrebuința o tehnică de întindere prin care să nu depășim pragul dintre cursul fiziologic încă normal, pe de o parte, și instalarea șocului traumatic, pe de altă parte. Am ales, în același timp, fragmente de țesut vegetal, ale căror celule posedau curenți de circulație constanți și suficient de rapizi.

MATERIALUL ȘI TEHNICA DE LUCRU

Am utilizat în cercetare epiderma superioară a solzilor de la bulbul de ceapă (*Allium cepa*) constituită, după cum se știe, dintr-un singur strat de celule detașabil, fără a provoca traumatisme. Experiențele s-au efectuat între 22.V și 6.VI.1963, deci într-o perioadă când planta se găsea în stare de vegetație deplină, bulbul fiind în creștere. Amănuntul are o importanță deosebită pentru experiențele noastre, deoarece, după cum reiese din constatările recente ale lui P. A. Henckel și N. D. Pronina (3), proprietățile fizice ale protoplastului în special în cazul celulelor epidermale de ceapă, sînt supuse unor variații care depind de starea activă sau de repaus a plantei. În cazul stării active de vegetație aceștia au surprins existența unei legături mai strînse între protoplast și pereții celulari, fapt de care am ținut în mod deosebit seama în interpretările noastre.

Prepararea materialului pentru observația microscopică am făcut-o după metodele indicate de S. Strugger (16), cu excepția infiltrării la trompă.

Mișcarea protoplasmei am urmărit-o la microscopul cu contrast de fază (Zeiss-Nf, ob. PHV apochromat 20 × ; oc. PK 16 ×). Viteza deplasării microzomilor (sferozomilor) a fost înregistrată cu ajutorul camerei clare conform metodei preconizate de R. Jarosch (4) și

întrebuințate de noi cu altă ocazie (10). Intervalul de timp la care s-au emis semnalele sonore necesare înregistrării a fost de 1,5 s.

Fragmentele de epidermă superioară au fost lăsate să plutească pe suprafața apei (de robinet) într-un cristalizor, timp de 30 min pentru a anula în acest fel efectul traumatic care s-ar fi putut produce asupra mișcărilor protoplasmatică prin manipulare.

Din fragmente am tăiat apoi fișii de lățime variabilă (1,6—4,6 mm, în medie 2,6 mm), pe care le-am așezat pe o lamă de microscopie atașată unui dispozitiv construit în laboratorul nostru în acest scop și pe care l-am numit microextensor (fig. 1). În principiu el pre-




Fig. 1. — Construcția microextensorului. A, Dispozitivul văzut de sus. B, Dispozitivul văzut în secțiune longitudinală. a, Corpul microextensorului; b, clemă fixă pentru încopcierea țesutului; c, lamă de sticlă; d, lamelă; f, țesut (fragment de epidermă); g, bordură; h, clemă cursoare; j, șanț de glisare; i, fir de mătase; k, scripete; l, greutate; m, taleraș; n, fantă înspre condensorul microscopului.

zintă unele asemănări cu microextensiometrul construit de M. C. Probine și R. D. Preston (13), cu deosebirea că dispozitivul nostru, necesitînd adaptarea la măsura microscopului, are o poziție orizontală.

Fișia de țesut cercetată am prins-o la un capăt de clemă fixă a microextensorului (fig. 1, b), iar la celălalt de clemă cursoare (fig. 1 h). În porțiunea supusă observației microscopice, ea s-a găsit cuprinsă între lamă și lamelă, într-un mediu potrivit (apă de robinet).

Experiența s-a desfășurat în următoarele etape:

a) Din fișia de țesut fixată pe microextensor am ales pentru efectuarea observațiilor, la întâmplare, o singură celulă. În afară de viteza mișcărilor protoplasmatică s-au măsurat: lungimea celulei (μ), lățimea și înălțimea fișiei de țesut (mm). Talerașul de aluminiu pentru greu-

tăți al microextensorului (fig. 1, *m*) se găsea atașat clemei cursoare. Înregistrarea mișcărilor protoplasmatică s-a făcut timp de 15 min. Rezultatele au constituit proba martor a fiecărei fișii.

b) În etapa a doua s-a așezat pe taleraș o greutate de 10 g care a întins vizibil țesutul timp de 2 min. Apoi greutatea a fost contraechilibrată cu ajutorul unei balanțe farmaceutice în așa fel, încât întinderea atinsă să rămână constantă, iar țesutul să nu fie supus unei acțiuni continue a forței de întindere. S-a așteptat circa 3 min ca efectul șocului de întindere să dispară. Răstimpul a fost folosit pentru a efectua măsurătorile privind modificările în lungime, lățime și înălțime a celulei. Apoi, timp de 10 min s-a înregistrat viteza microzomilor. La intervale relativ regulate, din 15 în 15 min, sarcina de pe taleraș s-a mărit cu câte 10 g, repetându-se de fiecare dată seria de măsurători de mai sus. Experiența am continuat-o până în momentul ruperii țesutului sub acțiunea forței de întindere.

Prelucrarea datelor înregistrate s-a făcut conform normelor cerute de statistica matematică (14), (18), utilizate de noi și într-o lucrare anterioară (10). S-au cercetat în total 39 de celule. În intervalele de timp de câte 15 min, viteza medie a microzomilor s-a calculat pe baza a circa 40–80 de măsurători individuale.

Pe baza datelor privind modificările de dimensiune ale celulelor și fișii de țesut, precum și ale greutăților aplicate s-au calculat: a) alungirea relativă a celulei, conform formulei: $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$, unde ε = alungirea relativă, Δl = valoarea absolută a alungirii celulei iar l = lungimea inițială a celulei. Alungirea relativă în graficele noastre am exprimat-o în procente (coeficientul de extensiune); b) efortul sau tensiunea aplicată țesutului conform formulei: $\sigma = \frac{F_n}{S}$, unde σ = efortul, F_n = forța în g, S = unitatea de suprafață pe secțiune transversală. Mărimea efortului ne-a dat unele informații prețioase cu privire la forța de întindere care a fost aplicată țesuturilor. Partea fizică a problemelor legate de întinderea mecanică a țesuturilor vii am tratat-o în concordanță cu principiile fizicii moleculare privind deformarea corpurilor solide (1), (2) și cu lucrările clasice ale lui R. D. Preston și colaboratori (12), (13) privind proprietățile mecanice ale pereților celulari.

REZULTATE

Investigațiile noastre au dus la rezultate foarte variate, care ne-au obligat să clasificăm celulele după comportamentul arătat de mișcarea protoplasmatică în urma acțiunii forței de întindere. Am delimitat astfel șase tipuri de reactivitate. În cadrul fiecăruia dintre ele s-a semnalat existența citorva subtipuri sau variante, în funcție de momentul în timp și de greutatea aplicată, la care a avut loc ruperea țesutului.

1. **Tipul I.** În tipul I am încadrat celule a căror mișcare protoplasmatică a rămas constantă ca viteză sau a manifestat o foarte slabă stimulare în urma acțiunii forței de întindere. Criteriul de apreciere a semnificației diferențelor între mediile vitezelor microzomilor l-a constituit, în primă aproximație, limitele abaterii standard ale martorului. Din totalul celulelor cercetate aproximativ 31% au aparținut acestui tip (12 celule din 39).

În figura 2 sînt redată grafic rezultatele obținute. Se constată că nu toate fișile de țesut au rezistat în măsură egală forței de întindere. Fișile grupate în varianta A au suportat inițial un șoc de circa 85 g/mm² de secțiune transversală. În consecință, celulele lor s-au alungit dintr-odată foarte mult (2,41%). La cel de-al doilea șoc însă țesutul s-a rupt. În tot

acest răstimp, deși celulele s-au întins apreciabil (6,43%), stimularea a fost foarte slabă.

În cazul variantei B, șocul inițial a fost mai scăzut, de circa 60 g/mm², de aceea fișile de țesut au rezistat mai mult în timp, chiar pînă la adăugarea greutății de 40 g. Alungirea celulelor la primul șoc a fost mai redusă (2,13%), în schimb ea a atins valori mai ridicate (circa 12%) înainte de ruperea țesutului. Cu toate că extensiunea finală a celulelor




Fig. 2. — Dependența mișcărilor protoplasmatică de gradul de întindere mecanică (coeficientul de extensiune a celulelor) în cazul tipului I de comportare a dinezii. Cifrele din dreptul cerculețelor indică intervalele în timp (de câte 15 min fiecare) pentru un număr de măsurători și sarcina de câte 10 g adăugată de fiecare dată pe talerașul microextensorului; literele mari din dreptul curbilor indică variantele.

a fost apreciabilă în cazul variantei B, viteza mișcărilor protoplasmatică s-a menținut aproape constantă. Diferențele între valoarea maximă și cea minimă ale vitezei nu depășesc 1 μ/s.

Fișile de țesut aparținând variantei C, inițial au fost supuse celui mai redus șoc, de circa 50 g/mm², în consecință, întinderea celulelor a fost de asemenea redusă (1,06%). Aceasta a favorizat, probabil, rezistența țesuturilor pînă la aplicarea greutății de 60 g și a permis extensiunea finală a celulelor cu circa 18%. Și în cazul acestei variante s-a înregistrat o slabă stimulare a dinezii, viteza microzomilor menținându-se mai mult sau mai puțin constantă, cu excepția momentului al patrulea de la începutul experienței (după adăugarea greutății de 40 g).

2. **Tipul II.** Aici am încadrat celule a căror mișcare protoplasmatică s-a inhibat în urma acțiunii forței de întindere. Opt din celulele cercetate, aproximativ 21%, au aparținut acestui tip.

Rezultatele prezentate grafic (fig. 3) ne indică existența unor asemănări, dar și a unor deosebiri, în comparație cu tipul I. În cazul tipului II, de asemenea nu toate fișile de țesut au rezistat în mod egal la întinderea mecanică (forță aplicată și durată în timp), deși ele au avut de suportat la primul șoc (adăugarea greutății de 10 g) aproape aceeași sarcină (variante A : 57 g/mm²; varianta B : 58 g/mm² și varianta C : 56 g/mm²). Deosebiri

devin însă evidente, comparând gradul de extensiune a celulelor. Celulele variantei *A* tipul II s-au întins înainte de ruperea țesutului la dublu (11,8%) față de cele ale variantei *A* tipul I (6,43%), tot așa și cele ale variantei *B*: 24% în comparație cu 11,78% la varianta *B* tipul I. Varianta *C* face excepție de la această regulă, cu toate că și celulele ei s-au întins apreciabil în stadiul final (16,17% în cazul tipului II, 17,98% în acela al tipului I).

Mișcarea protoplasmatică, după cum reiese din grafice, a prezentat corelativ cu întinderea excesivă a celulelor, o inhibiție crescândă. Comparând viteza medie a microzomilor de la variantele tipului I cu acele de la varian-




Fig. 3. — Dependența vitezei mișcărilor protoplasmatiche de gradul de întindere mecanică a celulelor, în cazul tipului II de comportare a dinezii.

tele tipului II, sîntem pe deplin îndreptățiți să presupunem că întinderea excesivă a fost cauza încetării mișcării protoplasmatiche.

3. Tipul III. Celulele aparținînd acestui tip au prezentat, în urma acțiunii forței de întindere, o ușoară stimulare, care a evoluat însă spre inhibiție. Au reacționat conform acestui tip 6 din celulele cercetate (aproximativ 15%).

În figura 4 este ilustrat comportamentul a trei variante (*A*, *B* și *C*) din cadrul acestui tip. Și în acest caz constatăm rezistența inegală a fișilor de țesuturi la acțiunea forței de întindere. Într-un mod cu totul asemănător tipului I, variantele tipului III au rezistat la acțiunea forței de întindere invers proporțional cu sarcina primului șoc.

Întinderea celulelor a fost direct proporțională cu această sarcină, iar de întinderea fizică a lor se pare că a depins mișcarea protoplasmatică. Sarcina ridicată în cazul variantelor *A* (98 g/mm²) și *B* (56 g/mm²) a provocat o întindere relativ însemnată a celulelor (între 2 și 4%). Stimularea mișcării protoplasmatiche a fost însă redusă, uneori (la varianta *B*) viteza medie a microzomilor nedeășind limita abaterilor standard ale matorului. La varianta *C*, care a avut de suportat o sarcină mică (25 g/mm²), celula observată (nr. 13 din serie) s-a întins abia cu 0,81%. În schimb, mișcarea protoplasmatică a fost stimulată mai puternic în comparație cu primele variante ale acestui tip.

Extensiunea pe care a atins-o celula variantei *C* înainte de ruperea țesutului este surprinzătoare (37,1%), iar mișcarea protoplasmatică, cu toată întinderea excesivă, pare să revină la normal. Avem de-a face, după cum reiese din analiza coeficienților de variație (8,7% în cazul stimulării maxime și 21,8% în acela al „revenirii” înainte de rupere), cu o restabilire „aparentă”¹ a mișcării protoplasmatiche. Coeficientul de variație ridicat ne indică un grad apreciabil de neregularitate a vitezelor microzomilor.




Fig. 4. — Dependența vitezei mișcărilor protoplasmatiche de gradul de întindere mecanică a celulelor, în cazul tipului III de comportare a dinezii.

4. Tipul IV. La acest tip, în urma acțiunii forței de întindere, a avut loc o stimulare imediată a mișcărilor protoplasmatiche, urmată apoi de o revenire „aparentă” la normal. În tipul IV s-au încadrat 6 dintre celulele studiate (aproximativ 15%).

În cazul primelor două variante (*A* și *B*), sarcina primului șoc a fost foarte mare, în medie de circa 100 g/mm². Cu toate acestea, celulele s-au întins relativ puțin (sub 2%), iar mișcarea protoplasmatică a fost stimulată invers proporțional cu coeficientul de extensiune (fig. 5). La ultimele două variante, sarcina primului șoc a fost relativ scăzută (39 g/mm² în cazul variantei *C*, 25 g/mm² în acela al variantei *D*). Extensiunea celulelor a fost mică (în jur de 1%), în schimb mișcarea protoplasmatică a fost stimulată puternic depășind uneori (varianta *D*) de 2 — 2,5 ori matorul.

Extensiunea peste valoarea de 6% a celulelor a dus în cazul tuturor variantelor și tipurilor la încetinirea mișcărilor protoplasmatiche, deci la o revenire la normal. Analog cazului întâlnit la tipul III varianta *C*, restabilirea „normalului”, după cum ne indică coeficienții de variație, este numai aparentă.

¹ Am considerat mișcări protoplasmatiche normale acelea cu o viteză constantă și cu un coeficient de variație scăzut, care reflectă existența unor deplasări cit mai regulate ale microzomilor. Stimularea reală a mișcărilor plasmatice a fost deci însoțită întotdeauna de o scădere a valorii coeficientului de variație. Stimularea sau menținerea normală a vitezei mișcării protoplasmatiche, dar asociată cu o creștere a coeficientului de variație, am considerat-o „aparentă”, deoarece ea reflectă coexistența unor deplasări reduse ale microzomilor cu altele excesiv de rapide. Evident că în acest caz am avut de-a face cu o mișcare neuniformă și neregulată.




Fig. 5. — Dependența vitezei mișcărilor protoplasmice de gradul de întindere mecanică a celulelor, în cazul tipului IV de comportare a dînzei.




Fig. 6. — Dependența vitezei mișcărilor protoplasmice de gradul de întindere mecanică a celulelor, în cazul tipului V de comportare a dînzei.




Fig. 7. — Dependența vitezei mișcărilor protoplasmice de gradul de întindere mecanică a celulelor, în cazul tipului VI de comportare a dînzei.

5. **Tipul V.** Numărul de celule aparținând acestui tip este mult redus (4 celule, circa 10 % din totalul celor cercetate), de regulă câte una de variantă, pentru a ne permite considerații ample. Ne mărginim să constatăm (fig. 6) că, în urma acțiunii forței de întindere, mișcarea protoplasmatică este mai întâi ușor inhibată, apoi stimulată. Înainte de ruperea țesutului se întrevede tendința de revenire la „normal”.

6. **Tipul VI.** Acestui tip îi aparțin numai 3 celule (8 %), câte una de fiecare variantă. Prin urmare, datele pe care le deținem, ca și în cazul tipului precedent, sînt insuficiente pentru o analiză detaliată a comportării dînzei față de întindere. Semnalăm doar forța redusă a primului șoc de întindere (45 g/mm² în cazul variantei A, 25 g/mm² în acela al variantei B și 21 g/mm² în acela al variantei C), care a avut drept urmare o extensiune neînsemnată a celulelor (1,81 % la varianta A, 1,41 % la varianta B și 1 % la varianta C). La șocurile următoare, spre deosebire de toate celelalte tipuri analizate, pasul de extensiune nu a crescut excesiv de mult. În cazul variantei C s-a menținut tot timpul constant, mărindu-se de fiecare dată cu 1 %. Poate că tocmai aceste circumstanțe au condiționat răspunsul oscilant al dînzei la acțiunea forței de întindere (fig. 7).

DISCUȚIA REZULTATELOR

Experiențele privind extensiunea mecanică a celulelor, deci și a protoplasmei, ne-au arătat cît de variate pot fi comportările dînzei ca răspuns la forța de întindere aplicată. Dar și condițiile de experimentare au fost în mod inevitabil diferite de la o celulă la alta.

În primul rînd, menționăm că înregistrarea mișcărilor protoplasmice nu s-a putut face întotdeauna la celule de lungime egală. Înainte de întindere, ele au avut în medie $540 \pm 170 \mu$ lungime (cea mai mică a fost de 330 μ , cea mai mare de 1 010 μ), deci un coeficient de variație foarte ridicat: 31 %. În al doilea rînd, lățimea fișilor de țesut, după cum s-a mai menționat, de asemenea a fost inegală. Acest factor a modificat de fiecare dată valoarea forței de întindere aplicate pe suprafața de secțiune transversală. În al treilea rînd, în intervalul de timp afectat cercetării (mai-iulie), epiderma superioară a cepii a îmbătrînit mereu, pereții celulari s-au consolidat și și-au schimbat compoziția chimică, protoplasma însăși a suferit diverse modificări fizico-chimice.

Nerepetarea cu strictețe a aceluiași condiții pentru fiecare experiență în parte constituie, desigur, un neajuns al investigațiilor noastre. El este însă compensat prin numărul mare de informații obținute pe un material cît mai variat. Ținînd seamă de aceste circumstanțe, considerăm că observațiile noastre nu au epuizat subiectul, ci ne-au oferit doar o largă perspectivă asupra numeroaselor probleme pe care le ridică raportul dintre dîneză și întinderea mecanică a celulelor.

Avînd permanent în vedere sublinierile de mai sus, vom analiza, în lumina datelor obținute, modul în care întinderea mecanică a influențat mișcarea protoplasmatică.

Factorul prim, de care depinde comportamentul dinezii în cazul întinderii fizice, îl constituie proprietățile mecanice ale pereților celulari și deci rezistența acestora la rupere, care a fost destul de variată la diferite fișii de țesuturi. Variația accentuată a proprietăților mecanice poate să se datoreze în mare parte factorilor discutați mai sus, dar ea este prezentă și în cazul alegerii unor condiții experimentale foarte constante (13).

În cazul nostru se constată că *inhibiția mișcărilor protoplasmaticelor* s-a instalat în celulele acelor țesuturi care *au rezistat un timp mai scurt până la rupere* (cel mult 60 — 90 min) și care, în acest interval, *s-au întins extrem de mult*. La inhibiție a contribuit și întinderea relativ accentuată chiar după primul șoc. Este probabil că rezistența scăzută a pereților la rupere și întinderea lor rapidă produc anumite tensiuni la nivelul citoplasma-perete celular.

Celulele a căror dineză nu a suferit modificări în urma întinderii mecanice de asemenea au aparținut unor țesuturi care au rezistat puțin în timp până la rupere (45 — 100 min). Întinderile finale, ca și cele de după primul șoc, au fost însă mai atenuate.

La fel, *stimularea mișcărilor protoplasmaticelor a depins de proprietățile mecanice ale pereților celulari*. În toate cazurile de stimulare, *fișile de țesuturi au rezistat relativ mai mult în timp până la rupere* (75 — 120 min) și, în general, exceptând tipul III care se sfârșește de altfel cu inhibiție, întinderea finală a celulelor a fost scăzută. Întinderea celulelor în urma primului șoc, în cazul stimulărilor, rareori a depășit 2,5%. Se constată că, după o întindere mai mare de 6 — 8% a celulelor, o stimulare reală a mișcărilor protoplasmaticelor nu mai este posibilă.

Caracterul oscilant al mișcărilor protoplasmaticelor pare a fi condiționat de o rezistență ridicată a fișilor de țesuturi la rupere (75 — 190 min) și de întinderi inițiale, respectiv pași de întindere moderați.

Faptul că variațiile dinezii în experiențele de întindere mecanică depind de proprietățile mecanice ale pereților celulari și mai puțin de forța aplicată atestă legătura strinsă dintre pereți și protoplasmă. În orice caz, pereții celulari sînt primii constituenți care suportă acțiunea șocului mecanic de întindere și ei opun cea mai mare rezistență acestuia. Citoplasma urmează fidel pereții celulari în întindere, dar este posibil ca prin intermediul plasmodesmelor, la fiecare șoc, ea să capete continuu informații asupra noilor tensiuni. Acest fapt pare să fie ve osimil, deoarece timp de 2 — 3 min după fiecare șoc de întindere, curenții protoplasmatici s-au încetinit ori alteori s-au oprit.

CONCLUZII

1. Întinderea mecanică a celulelor, deci și a plasmiei, constituie un factor stimulator al mișcărilor protoplasmaticelor numai între anumite limite fiziologice.

2. Stimularea mișcărilor protoplasmaticelor este posibilă numai în cazul unor extensiuni relativ scăzute ale celulelor. Ea mai este condițio-

nată și de o rezistență accentuată a celulelor și a țesuturilor la întinderea mecanică.

3. Inhibiția mișcărilor protoplasmaticelor se produce prin întinderi relativ bruste și excesive ale celulelor, datorită slabei rezistențe a pereților lor la extensiune și a țesuturilor la rupere.

4. La granița dintre extensiunile scăzute și excesive ale celulelor, întinderea mecanică nu are nici un efect asupra mișcărilor protoplasmaticelor.

5. Întinderile reduse și cu un pas de extensiune relativ uniform, provoacă, după toate probabilitățile, oscilații în desfășurarea dinezii.

BIBLIOGRAFIE

1. BEIER W. u. DÖRNER E., *Die Physik und ihre Anwendung in Biologie und Medizin*, Georg Thieme, Leipzig, 1956, 1.
2. FRIS S. E. și TIMOREVA V. A., *Curs de fizică generală*, Edit. tehnică, București, 1964, 1.
3. ГЕХКЕИ П. А. и ПРОНИНА Н. Д., *Физиол. растений*, 1963, 10, 124—129.
4. JAROSCH R., *Protoplasma*, 1956, 47, 478—486.
5. KAMIYA N., *Protoplasmic streaming*, in Heilbrunn und Webers *Protoplasmatologia. Handbuch der Protoplasmaforschung*, Springer, Viena, 1959, 8.
6. KÜSTER E., *Flora*, 1910, 100, 267—287.
7. POP E., *Bul. științ. Acad. R.P.R., Secția de șt. biol., agr., geol. și geogr.*, 1955, 7, 1, 13—28.
8. — *Rev. de Biol.*, 1960, 5, 4, 265—274.
9. POP E. et SORAN V., *Rev. roum. de Biol., Série de Botanique*, 1965, 10, 5, 383—391.
10. POP E., SORAN V. și VINTILĂ R., *St. și cerc. biol., Seria biol. veget.*, 1963, 15, 3, 309—330.
11. POP E., SORAN V., VINTILĂ R. et ȘTIRBAN M., *Rev. roum. de Biol., Série de Botanique*, 1964, 9, 6, 377—386.
12. PRESTON R. D., *Mechanical properties of the cell wall*, in RUHLAND'S, *Encyclopedia of Plant Physiology*, Springer Verlag, Berlin — Göttingen — Heidelberg, 1955, 1, 745—751.
13. PROBINE M. C. a. PRESTON R. D., *J. of Exp. Bot.*, 1962, 37, 111—172.
14. SĂHLEANU V., *Metode matematice în cercetarea medico-biologică*, Edit. medicală, București, 1957.
15. SORAN V., *St. și cerc. biol., Acad. R.P.R. Filiala Cluj*, 1957, 8, 295—305.
16. STRUGGER S., *Praktikum der Zell- und Gewebephysiologie der Pflanze*, Springer, Berlin — Göttingen — Heidelberg, 1949.
17. TAYLOR F. J., *Nature*, 1958, 181, 136—137.
18. WEBER E., *Grundriss der biologischen Statistik*, Gustav Fischer, Jena, 1963.

Centrul de cercetări biologice, Cluj,
Secția de fiziologie vegetală.

Primită în redacție la 30 ianuarie 1965.

CERCETĂRI ASUPRA UNOR FENOMENE FIZIOLOGICE LA PLANTE HIBRIDE ȘI LA FORMELE LOR PARENTALE*

DE
E. ȘERBĂNESCU

531 (05)

Autorul face un studiu fiziologic comparativ al fenomenului heterozis la mai multe specii de plante, folosind aceeași tehnică de cercetare, pentru a putea trage unele concluzii cu caracter de generalizare asupra unor manifestări fiziologice la plantele hibride și la formele lor parentale luate în cercetare.

Rezultatele au arătat că intensitatea fotosintezei este mai mare la hibridii de porumb și de tomate decât la formele parentale. Intensitatea respirației este mai mare la liniile consangvinizate de porumb și la soiurile parentale de tutun decât la hibridii respectivi. La tomate, intensitatea respirației hibridului este intermediară față de cele două soiuri.

În ceea ce privește raportul fotosinteză — respirație, acesta a fost în toate cazurile mai mare la hibridi în comparație cu părinții. Între activitatea catalazei și a respirației nu s-a găsit întotdeauna un paralelism. La hibridi, înălțimea plantelor, suprafața foliară și recolta de știuleți au fost mai mari decât cele ale liniilor consangvinizate. Viteza de imbibiție a semințelor liniilor de porumb a fost mai mare decât cea a hibridilor. Hibridii de porumb folosesc mai economic decât liniile consangvinizate substanțele de rezervă din sămânță în timpul germinației pentru formarea plantulei. S-a constatat de asemenea că greutatea embrionilor este mai mare decât greutatea embrionilor liniilor consangvinizate.

*Institutul de biologie „Traian Săvulescu”,
Secția de fiziologie vegetală.*

Primită în redacție la 11 februarie 1965.

*Lucrare publicată și în „Revue roumaine de Biologie—Série de Botanique”, 1966, 11, 2 (în limba franceză).

INTENSITATEA RESPIRAȚIEI ÎN DECURSUL VEȘTEJIRII FRUNZELOR LA UNELE PLANTE

DE
CECILIA DJENDOV

581(05)

În lucrare sînt expuse rezultatele obținute privind raportul dintre respirație și scăderea conținutului în apă în timpul veștejirii la frunzele mai multor specii de plante : grâu, fasole, floarea-soarelui, tomate, vinete și *Portulaca*. În toate cazurile se observă o intensificare a respirației la începutul veștejirii, după care scade paralel cu scăderea conținutului în apă din frunze, intensificare ce nu poate fi corelată cu cantitatea de glucide din frunze.

Procesul respirației fiind unul dintre procesele fundamentale ale vieții plantelor, după intensitatea lui se poate aprecia într-o măsură importantă întreaga activitate metabolică a plantei. Cercetările în legătură cu raportul dintre respirație și insuficiența apei din țesutul vegetal sînt numeroase, rezultatele obținute însă sînt contradictorii. Aceste cercetări au arătat că în general plantele mezofite își intensifică respirația pînă la un anumit grad de deshidratare (40 — 46 %) ; frunzele de *Elodea* cultivate în soluții de zaharoză, cu toate că suferă un grad destul de mare de deshidratare, nu au prezentat o intensificare a respirației. Din experiențele lui A.A. Zubrilin (10) privitoare la intensitatea respirației trifoiului în timpul uscării reiese că intensitatea respirației este cu atît mai mare, cu cît conținutul în apă este mai ridicat. Din aceste cîteva exemple se poate vedea că rezultatele diferite obținute la plantele supuse veștejirii se datoresc, în primul rînd, particularităților biologice ale țesuturilor vegetale studiate.

MATERIAL ȘI METODĂ

În lucrarea de față am urmărit și noi raportul dintre respirație și descreșterea conținutului în apă din frunzele mai multor specii de plante, și anume : grâu, fasole, floarea-soarelui, tomate, vinete și *Portulaca*. Plantele au fost cultivate în grădina Institutului botanic din București. În seara zilei care preceda experiențele propriu-zise am detașat de pe plantă




Fig. 1. — Mersul intensității respirației la frunzele de grâu în decursul vecheririi.




Fig. 3. — Mersul intensității respirației la frunzele de fasole în decursul vecheririi.




Fig. 5. — Mersul intensității respirației la frunzele de tomate în decursul vecheririi.




Fig. 2. — Mersul intensității respirației la frunzele de vinete în decursul vecheririi.




Fig. 4. — Mersul intensității respirației la frunzele de floarea-soarelui în decursul vecheririi.

frunze mature și le-am ținut până a doua zi dimineața în exicator cu apă, între hirtii de filtru îmbibate de asemenea cu apă. După aproximativ 12 ore am făcut prima determinare a respirației frunzelor saturate cu apă, acestea fiind supuse apoi vecheririi. Deoarece în experiențe preliminare am constatat că frunzele unor plante (tomate, *Portulaca*) se vechesc mai greu la temperatura camerei, am ținut frunzele, în vederea vecheririi, deasupra unui termostat la temperatura de 33°C. Intensitatea respirației s-a determinat cu ajutorul aparatului Warburg, la intervale de 2 ore. Paralel cu măsurarea intensității respirației s-a determinat și conținutul în apă al frunzelor la aceleași intervale de timp, prin ținerea materialului în termostat la temperatura de 105°C. La unele plante (tomate, *Portulaca*) am determinat și cantitatea de glucide din frunze, foloind metoda issekut.

REZULTATE

Din graficele întocmite (fig. 1 — 6), în care intensitatea respirației este exprimată în $\mu\text{l O}_2/\text{g}$ substanță proaspătă/oră, iar conținutul în apă în procente față de rezerva totală de apă, reiese că la majoritatea plantelor experimentate, intensitatea respirației în decursul vecheririi are un mers asemănător, curba respirației prezentând un maxim situat după 2 sau 4 ore de la începerea experienței, care corespunde unui conținut în apă în jur de 70%, după care intensitatea respirației scade destul de repede, paralel cu scăderea cantității de apă din frunze, până la încetarea fenomenului.

Dacă astfel se prezintă mersul respirației la frunzele de grâu, fasole, tomate, vinete și floarea-soarelui, la frunzele de *Portulaca* la care pierderea de apă este mult mai încheată, maximul intensității respirației este atins după 30 de ore de la începerea experienței (fig. 6).

De asemenea se mai poate observa că, în comparație cu frunzele de grâu, fasole, vinete și floarea-soarelui, la care intensitatea respirației scade




Fig. 6. — Mersul intensității respirației la frunzele de *Portulaca* în decursul vecheririi.

destul de brusc după ce atinge maximum, la tomate respirația se menține un timp aproximativ la același nivel după care începe să diminueze, fapt

Tabelul nr. 1

Intensitatea respirației (ml O ₂ /g substanță proaspătă/oră) și cantitatea totală de apă (% din rezerva de apă) în decursul vestejirii															
Planta		Durata vestejirii (ore)													
		0	2	4	6	8	10	12	14	16	24	31	38	40	
Tomate	IR	743	793	926	847	741	667	373	220	0	—	—	—	—	
	apa	100	93,6	87,3	85,0	77,8	71,1	63,6	33,6	26,1	—	—	—	—	
Grâu	IR	499	858	1025	758	381	126	0	—	—	—	—	—	—	
	apa	100	89,6	77,5	61,5	47,9	13,8	8,3	—	—	—	—	—	—	
Floarea-soarelui	IR	554	746	920	677	563	102	0	—	—	—	—	—	—	
	apa	100	96,3	89,1	82,4	66,3	31,4	20,9	—	—	—	—	—	—	
Fasole	IR	706	818	738	587	432	0	—	—	—	—	—	—	—	
	apa	100	85,5	68,2	63,7	53,9	47,6	—	—	—	—	—	—	—	
Vinete	IR	446	777	748	396	96	0	—	—	—	—	—	—	—	
	apa	100	87,1	81,8	79,5	68,5	60,3	—	—	—	—	—	—	—	
Portulaca	IR	204	—	—	189	—	215	—	216	—	377	494	167	0	
	apa	100	—	—	95	—	90,1	—	86,2	—	80	70,2	52	45	

* Intensitatea respirației

ce poate fi considerat ca un indiciu că tomatele sînt mai puțin sensibile la pierderea de apă, putînd în aceste condiții să-și mențină activitatea vitală la un nivel satisfăcător un timp mai îndelungat.

Pentru a înlesni interpretarea datelor obținute privind legătura dintre fenomenul respirației și conținutul în apă din frunzele supuse vesejirii prezentăm un tabel sintetic (tabelul nr. 1) în care sînt trecute valorile medii ale mai multor determinări efectuate la plantele din experiență. Din analiza tabelului reiese că în toate cazurile încetarea respirației este precedată de o pierdere destul de mare de apă din țesuturi în comparație cu mersul anterior al aceluiași proces. Se mai constată că fenomenul respirației mai are încă loc chiar atunci cînd în frunze se găsește o cantitate destul de mică de apă. Astfel, frunzele de grâu mai respiră încă la o pierdere foarte mare de apă (86%), urmate de floarea-soarelui, tomate, fasole și vinete.

Deoarece unii cercetători (3) presupun că scăderea intensității respirației în decursul vesejirii ar putea fi legată de scăderea conținutului în glucide din frunze, am făcut și noi unele determinări privind variația conținutului de glucide în frunzele de tomate și *Portulaca* în curs de vesejire la aceleași intervale de timp ca și în cazul respirației. Rezultatele sînt trecute în tabelul nr. 2, din care constatăm că valorile aflate pentru glucide

Tabelul nr. 2

Dinamica cantității de zahăr total din frunze în decursul vesejirii (mg glucoză la 1 g substanță uscată)

Data	Planta	Ore											
		0	2	4	6	8	10	12	14	24	28	31	38
8.VII. 1964	tomate	126,8	131,6	120,0	118,3	115,1	121,4	120,0	112,0	88,8	63,1	—	—
	Portulaca	61,1	56,0	55,5	50,2	50,0	44,4	40,1	37,9	29,8	27,2	—	—
13.VIII. 1964	tomate	146,3	—	—	130,1	—	111,1	—	75,5	—	—	—	—
	Portulaca	68,0	—	—	67,0	—	67,1	—	66	53,0	—	43,1	38,2

nu reflectă mersul intensității respirației în decursul vesejirii, deoarece nu găsim valori mai mari pentru glucide în cazul creșterii intensității respirației, ci doar o continuă scădere a cantității de glucide în frunze.

DISCUȚII

Măsurînd intensitatea respirației frunzelor diferitelor specii de plante în decursul vesejirii am constatat că la toate, aceasta provoacă la început o creștere a intensității respirației, urmată de o scădere a acestui proces mai mult sau mai puțin accentuată, în funcție de particularitățile fiziologice și de structura fiecărei plante. Rezultate asemănătoare au obținut și alți autori, fie că au experimentat influența vesejirii asupra frunzelor detașate de pe plantă, fie asupra frunzelor de pe plante supuse vesejirii

prin seceta atmosferică sau a solului. Astfel, o creștere a respirației ca urmare a insuficienței apei au obținut și A. Engraber (1), W. Palladin și S.I. Sheloumova (7), L.D. Musaeva (6), O. Stocker (9), N.S. Petinov și K.M. Maliseva (8).

A.L. Kursanov (3) presupune că scăderea cantității de zahăr în plante poate fi o cauză a diminuării intensității respirației. K. Mothes (5) este înclinat să vadă acțiunea lipsei de apă asupra respirației, în primul rând într-o modificare de structură, procesele hidrolitice ajungând să depășească și să predomină asupra celor sintetice.

W. Palladin (7) explică scăderea intensității respirației în cazul vștejirii frunzelor prin reducerea cantității de apă, care este sursa de oxigen în faza anaerobă a respirației. W. S. Iljin (2) consideră că, în condițiile secetei, zaharurile solubile se acumulează în plante, aceasta fiind după el cauza intensificării respirației. L. D. Musaeva (6), hrănind cu zaharuri plantele de orz ajunse într-un stadiu mai avansat de vștejire, a constatat că acestea nu influențează esențial asupra respirației. Analizele noastre cu privire la cantitatea de glucide din frunzele supuse vștejirii confirmă rezultatele obținute de Musaeva.

Din cele prezentate până acum desprindem faptul că dacă în evidențierea fenomenului de intensificare a respirației la începutul perioadei de vștejire există aproape o unanimitate de păreri, explicarea acestui fenomen se află încă în faza de ipoteză.

CONCLUZII

1. Frunzele de grâu, fasole, tomate, vinete, floarea-soarelui și *Portulaca* își intensifică respirația la începutul vștejirii, după care acest proces scade pe măsură ce se reduce și conținutul în apă din țesuturi.

2. Cantitatea de glucide scade pe măsură ce vștejirea avansează, neremarcându-se o legătură directă între cantitatea de glucide și intensificarea procesului respirației de la începutul vștejirii.

BIBLIOGRAFIE

1. ENSGRABER A., Flora (Jena), 1954, **141**, 432—475.
2. ILJIN W. S., Flora (Jena), 1923, **116**, 379—403.
3. КУРСАНОВ А. Л., Биохимия, 1950, **15**, 2.
4. MOTHES K., Ber. dtsh. bot. Ges., 1928, **46**, 59.
5. — Planta (Berlin), 1931, **12**, 686.
6. МУСАЕВА Л. А., Физиол. раст., 1957, **4**, 3, 234.
7. PALLADIN W. et SHELOUMOVA S. I., Bull. Acad. Sci. U.R.S.S., 1918, seria a VI-a, **8**, 801.
8. ПЕТИНОВ Н. С. и МАЛЫШЕВА К. М., Физиол. раст., 1960, **7**, 5, 563.
9. STOCKER O., Planta (Berlin), 1948, **35**, 445.
10. ЗУБРИЛИН А. А., Научные основы консервирования зеленых кормов, Сельхозгиз, Москва, 1947, 167.

Institutul de biologie „Traian Săvulescu”,
Secția de fiziologia plantelor.

Primită în redacție la 11 februarie 1965.

DESPRE BILANȚUL ENERGETIC AL FOTOSINTEZEI LA FASOLE

DE

VIORICA TĂNASE

581(05)

Randamentul fotosintezei față de lumina totală și față de lumina absorbită variază la plantele de fasole în decursul perioadei de vegetație și în funcție de îngrășămintele minerale administrate. Randamentul maxim corespunde intensității maxime a fotosintezei și oscilează între 0,2 și 2,4%. Administrarea îngrășămintelor minerale în varianta NP determină un randament anual mai mare decât la plantele martor.

Continuând cercetările întreprinse în anul 1963 (11) cu privire la randamentul fotosintezei la unele plante de cultură, în lucrarea de față dăm rezultate referitoare la influența elementelor minerale asupra randamentului fotosintezei.

Astfel, în acest scop, în vara anului 1964 am cultivat plante de fasole Bănățeană la Stațiunea experimentală Pantelimon a Facultății de biologie din București în următoarele 4 variante: varianta de control, plante cultivate pe sol neîngrășat; varianta N, plante cultivate pe sol îngrășat cu NO_3NH_4 ; varianta NP, plante cultivate pe sol îngrășat cu NO_3NH_4 și superfosfat, și varianta P, plante cultivate pe sol îngrășat cu superfosfat.

Am efectuat următoarele determinări:

1. Lumina totală căzută asupra terenului, lumina reflectată și lumina care străbate frunzele cu albedometrul Ianicevski și actinometrul Saviner.

2. Cantitatea de lumină absorbită de plante a fost calculată după formula utilizată de Moos și Loomis (5) și Sidorin (10).

3. Intensitatea fotosintezei (metoda Niciporoviici (7)).

4. Determinarea cantității de energie chimică potențială dintr-un gram de substanță uscată prin metoda calorimetrică.

5. Determinarea randamentului energetic al fotosintezei față de lumina totală și față de lumina absorbită de plante.

Rezultatele obținute au fost trecute în grafice și tabele.

În figura 1 este prezentată balanța radiativă în decursul unei zile de la începutul perioadei de vegetație (1.VI).

Lumina totală căzută asupra plantelor este reprezentată în grafic printr-o curbă în formă de clopot, cu un maxim la ora 12 și cu două minime la orele 6 și 18. Curba energiei luminoase absorbite are același aspect, dar valori mai scăzute. Față de lumina totală, care a avut la ora 12 o energie de 1,33 cal/min, energia luminii absorbite a fost de 0,88 cal/cm²·min.

Lumina reflectată este reprezentată printr-o curbă cu valori minime (0,06—0,05 cal/cm²·min). Lumina trecută prin frunze se prezintă sub forma unei curbe asemănătoare cu cea a luminii reflectate, dar cu valori ceva mai mari, și anume 0,08 la orele 6 și 18 și 0,23 cal/cm²·min la ora 12.

În figura 2 este reprezentat procentul de energie luminoasă absorbită, reflectată și trecută prin frunze în decursul zilei de 1. VI. La orele 6 și 18, când energia luminii totale a fost mică, plantele au absorbit o proporție mai scăzută de energie și anume 46 și 48%, iar la ora 12 — 66%. Lumina reflectată a avut cel mai mic procent la ora 12 (16%), iar dimineața și seara valori mai mari (24 — 25%). Lumina trecută prin frunze a prezentat valori procentuale mai mici (17%) la ora 12 și mai mari la orele 6 și 18 (28 și 25%).

În figura 3 se poate vedea mersul luminii absorbite, reflectate și trecute prin frunze în decursul unei zile de la sfârșitul perioadei de vegetație (28. VII). Plantele au absorbit cea mai mare cantitate de energie în orele amiezii; lumina trecută prin frunze, ca și lumina reflectată de acestea, au avut același mers, cu un maxim la orele amiezii și un minim la orele 6 și 18.

Figura 4 indică energia luminoasă absorbită, reflectată și trecută prin frunze în procente față de lumina totală, în ziua de 28. VII. Față de ziua de 1. VI, proporția luminii absorbite a fost mai scăzută și anume 22 și 28% la orele 6 și 18 și 40—48% între orele 12 și 15. Lumina reflectată a prezentat valori mai ridicate decât în ziua de 1. VI, și anume 36 și 32% la orele 6 și 18 și 28—19% între orele 12 și 15. Lumina trecută a fost de 42 și 40% la orele 6 și 18 și 30—31% la orele 12 și 15.

Cantitatea de energie luminoasă absorbită, reflectată și trecută prin frunze în decursul perioadei de vegetație (media pe zile) este reprezentată în figura 5. Din grafic reiese că la începutul perioadei de vegetație plantele au absorbit un procent mai mare de lumină (60—65%) decât la sfârșitul acesteia, când a scăzut treptat (până la 35%). În decursul perioadei de vegetație, procentul luminii reflectate a evoluat în felul următor: de la 21%, cât era la începutul perioadei de vegetație, a crescut până la 29% la sfârșitul acestei perioade. Energia luminoasă trecută prin frunze a avut o evoluție asemănătoare în decursul perioadei de vegetație, și anume a crescut de la 18 la 35%.

În figura 6 am reprezentat dinamica suprafeței foliare a unei plante în dm² (media a 30 de plante) în decursul perioadei de vegetație, la plante crescute în condiții de îngrășămintă chimice diferite. Plantele de control au avut până la sfârșitul perioadei de vegetație cea mai mică suprafață foliară. Aceasta a crescut treptat până la 550 dm² la 30. VI, după care a scăzut până la sfârșitul perioadei de vegetație. În ceea ce privește plan-




Fig. 1. — Lumina totală, absorbită, reflectată și trecută prin frunzele de fasole în ziua de 1. VI.




Fig. 3. — Lumina totală, absorbită, reflectată și trecută prin frunzele de fasole în ziua de 28. VII.





Fig. 2. — Lumina absorbită, reflectată și trecută prin frunzele de fasole, în procente față de lumina totală.




Fig. 4. — Lumina absorbită, reflectată și trecută prin frunzele de fasole față de lumina totală.

Fig. 5. — Lumina absorbită, reflectată și trecută prin frunzele de fasole în procente față de lumina totală în decursul perioadei de vegetație.

tele cultivate pe teren îngrășat, acestea au avut un mers asemănător al dinamicii suprafeței foliare, maximul atins prezentând valori mai mari decât la plantele de control. Dintre acestea, plantele din varianta P au atins cea mai mare suprafață foliară (886 dm^2) cu o săptămână mai târziu decât plantele de control.

În figura 7 am reprezentat creșterea greutății substanței uscate la o plantă de fasole (media a 30 de plante) în decursul perioadei de vegetație. În prima jumătate a acestei perioade s-a înregistrat o creștere lentă în greutate, plantele de control prezentând valorile cele mai scăzute. Începând de la 17.V plantele au crescut mai rapid în greutate, cu excepția celor de control, care au avut și în această perioadă o creștere mai redusă. Cel mai intens au crescut în greutate plantele din varianta P.

Intensitatea fotosintezei în $\text{g/dm}^2 \cdot \text{zi}$ este reprezentată în figura 8. La toate variantele studiate, curba fotosintezei în decursul perioadei de vegetație a prezentat două maxime și o depresiune corespunzătoare începutului înfloririi plantelor. Au făcut excepție numai plantele din varianta NP, care au avut o creștere treptată a intensității fotosintezei, cu un singur maxim în a doua jumătate a perioadei de vegetație. În general, valorile maxime din prima jumătate a perioadei de vegetație au fost asemănătoare la plantele studiate, cu excepția variantei P, al cărei maxim a fost situat cu o săptămână mai târziu și cu o valoare mai mare decât la plantele de control ($0,1 \text{ g/dm}^2 \cdot \text{zi}$ față de $0,09 \text{ g/dm}^2 \cdot \text{zi}$).

Cel de-al doilea maxim al fotosintezei a atins la plantele din varianta N cea mai mare valoare, și anume $0,195 \text{ g/dm}^2 \cdot \text{zi}$ față de $0,132 \text{ g/dm}^2 \cdot \text{zi}$ la plantele de control, la care fotosinteza a înregistrat valorile cele mai scăzute. Variantele NP și P au prezentat în timpul celui de-al doilea maxim valori intermediare între plantele de control și cele din varianta P.

În figura 9 am reprezentat randamentul fotosintezei față de lumina totală la toate variantele de fasole. Din grafic reiese că randamentul evoluează în timp într-un mod analog mersului fotosintezei în decursul perioadei de vegetație, adică la toate variantele, cu excepția variantei NP, curba randamentului a avut două maxime și un minim la începutul înfloririi plantelor. Cele mai mari valori ale randamentului l-au avut plantele din varianta P, în momentul celor două maxime, dar, spre deosebire de plantele de control, aceste valori s-au obținut cu o săptămână mai târziu. Primul maxim a fost de $0,7$ față de $0,5\%$ la plantele de control iar al doilea maxim de $1,24$ față de $0,86\%$. Valori mai scăzute decât la plantele de control au prezentat plantele din varianta N. Plantele din varianta NP nu au înregistrat decât un singur maxim în a doua jumătate a perioadei de vegetație, a cărui valoare a fost apropiată de a celui de-al doilea maxim al plantelor din varianta P, și anume $1,14\%$.

Din figura 10 se poate vedea mersul randamentului fotosintezei față de lumina absorbită. Aceasta a avut la toate variantele o evoluție asemănătoare cu cea a randamentului fotosintezei față de lumina totală, dar cu valori mai ridicate. Cea mai mare valoare a randamentului au avut-o plantele din varianta P în timpul celor două maxime, și anume: $1,28\%$ între 30.VI și 8.VII și $2,42\%$ între 14 și 21.VII. Plantele din varianta N au avut un randament al fotosintezei mai mic decât al plantelor de control, dar cele




Fig. 6. — Dinamica suprafeței foliare a plantelor de fasole, cultivate în condiții diferite de îngrășăminte chimice, în decursul perioadei de vegetație.




Fig. 7. — Creșterea greutății substanței uscate la o plantă de fasole (media a 30 de plante) în condiții diferite de îngrășăminte chimice, în decursul perioadei de vegetație.




Fig. 8. — Intensitatea fotosintezei plantelor de fasole cultivate în condiții de îngrășăminte chimice diferite, față de lumina totală în decursul perioadei de vegetație.




Fig. 9. — Randamentul fotosintezei plantelor de fasole cultivate în condiții diferite de îngrășăminte chimice, față de lumina totală în decursul perioadei de vegetație.

două valori maxime ale randamentului fotosintezei înregistrate de aceste plante au coincis în timp cu cele două maxime ale randamentului plantelor de control. În timpul celor două maxime randamentul fotosintezei acestor




Fig. 10. — Randamentul fotosintezei plantelor de fasole cultivate în condiții diferite de îngrășăminte chimice, față de lumina absorbită în decursul perioadei de vegetație.

plante a fost de 0,84 și de 1,12% față de 0,90 și 1,60%, cit era la plantele de control. Numai în timpul acestor două maxime randamentul fotosintezei plantelor din varianta N a depășit pe cel al plantelor de control; în restul perioadei de vegetație randamentul fotosintezei acestor plante s-a menținut cu valori mult mai scăzute decât la plantele de control. Plantele din varianta NP au prezentat aceeași caracteristică a randamentului fotosintezei în lumina absorbită ca și în lumina totală, adică o creștere continuă, treptată și un maxim între 14 și 21.VII de 2,2%, iar în ultimul interval, 21 — 28.VII, randamentul fotosintezei s-a păstrat la un nivel foarte ridicat, de 1,89%.

Din tabelul nr. 1 se vede că la plantele din varianta NP randamentul anual față de lumina totală a avut cea mai mare valoare, 0,508%, în timp ce la plantele din varianta N s-a înregistrat cel mai mic randament, aceasta ca urmare a faptului că N sub formă de NO_3 împiedică formarea nodozită-

Tabelul nr. 1

Randamentul anual la plantele de fasole în funcție de îngrășămintele primite, de lumina totală Q și de cea absorbită A

Varianta	N	NP	P	M
Lumina				
Q	0,360	0,508	0,463	0,448
A	0,681	0,990	0,837	0,843

ților la plantele leguminoase. În funcție de lumina absorbită, randamentul maxim l-au avut tot plantele din varianta NP, și anume de 0,990%, adică aproape 1%.

DISCUTAREA REZULTATELOR

Datele experimentale obținute în lucrarea de față referitoare la raportul dintre lumina totală, absorbită, reflectată și trecută prin frunze concorda cu cele ale altor cercetători.

Astfel A.A. Niciporovici și S.N. Cimora (8), care au lucrat tot cu albedometrul Ianicevski și actinometrul Saviner, au calculat pentru plantele de cartof în perioada încheierii rindurilor un procent de 60 — 75 lumină absorbită și de 20 — 25 lumină reflectată. Datele din lucrarea noastră arată că cel mai mare procent de lumină absorbită în decursul zilei a fost de 75 la ora 12 în ziua de 17.VI, iar cel mai mic de 22 în ziua de 28. VII la ora 6. Media de lumină absorbită pe zi arată o valoare maximă de 65% în ziua de 17.VI și minimă de 35% la 28.VII, la sfârșitul perioadei de vegetație. Moos și W. E. Loomis (5) au găsit pentru lumina absorbită valori de 82% din lumina vizibilă, care după A.A. Niciporovici și colaboratori (9) constituie 55% din lumina solară totală. Cel mai mare procent de lumină (92%) l-au absorbit plantele din radiațiile cu lungimea de undă de 400 mμ.

M.I. Sidorin (10) a determinat la plante diferite aceleași procente de lumină absorbită ca și W. E. Loomis (5); și anume 84% din lumina vizibilă și 55% din lumina totală. În lucrarea de față, am arătat că lumina reflectată de plante alcătuiește 20% din lumina totală la începutul perioadei de vegetație și 29% la sfârșitul acestei perioade. Acest lucru a fost observat și de către Moos și W. E. Loomis (5), care au arătat că plantele cu frunze îngălbenite reflectă un procent de lumină mai mare decât cele de culoare verde închis.

E.C. Wassink și colaboratori (13), lucrând cu sfeclă de zahăr în condiții de lumină artificială de intensități limitate au obținut valori ale randamentului fotosintezei de 12 — 19%. Ei au arătat că randamentul

fotosintezei variază în decursul ontogenezei, fiind maxim către mijlocul perioadei de vegetație.

În lucrarea noastră am obținut pentru fasole valori mai mici ale randamentului, între 0,2 și 1,24% din lumina totală și 0,2 — 2,4% din lumina absorbită. Valori mai mari ale randamentului (5%) am înregistrat la plantele de orz în mijlocul perioadei de vegetație (11). E.C. Wassink (12) a arătat că, la cartofi, randamentul fotosintezei a crescut în prima parte a perioadei de vegetație până la un maxim de 5%.

În această lucrare, noi am demonstrat de asemenea că randamentul maxim al fotosintezei a durat 1 — 2 săptămâni, după care a scăzut brusc. M. S. Kamel (2), (3), experimentând pe plante de cartof a arătat că randamentul maxim de 13,5%, obținut la mijlocul perioadei de vegetație la intensități maxime de lumină, a durat două săptămâni, după care a scăzut brusc. B.I. Huliev (1) a obținut valori foarte mari ale randamentului fotosintezei (27,6%) din radiațiile fiziologice active atunci când frunzele au avut cea mai mare activitate fiziologică și au fost iluminate cu o lumină foarte slabă, cu o energie 0,01 cal/cm²·min.

Randamentul anual de 2,2% față de lumina absorbită obținut de E.C. Wassink și colaboratori (13) la plantele de sfeclă de zahăr a fost mai mare decât randamentul anual al plantelor de fasole studiate în lucrarea de față (1% din lumina absorbită). Randamentul fotosintezei obținut de noi la plantele de fasole a fost de asemenea mai scăzut ca valoare decât cel obținut de A.A. Niciporovici (6), care a arătat că plantele de fasole folosesc în fotosinteză 1 — 2% din energia luminoasă care cade asupra lor. A.F. Kleinin și colaboratori (4) au dat în lucrarea lor valori mai mari ale randamentului, și anume 4% din lumina absorbită. Într-o lucrare publicată anterior (11), randamentul fotosintezei la plantele de orz a fost în medie de 3,2% din lumina absorbită. După B.I. Huliev (1), randamentul anual la sfecla de zahăr a fost de 3,5% și pentru porumb de 6,3%, iar pentru loturi cu o productivitate intermediară de 2% din lumina absorbită. Față de lumina totală, valoarea randamentului fotosintezei la loturi intermediar productive a fost sub 1%.

CONCLUZII

1. Energia luminoasă absorbită de plante variază în decursul zilei și al perioadei de vegetație în funcție de intensitatea luminii și de îmbătrânirea frunzelor. În jurul orei 12, plantele absorb cea mai mare cantitate de lumină la intensități maxime ale acesteia. În decursul perioadei de vegetație, lumina reținută scade o dată cu vârsta plantelor.

2. În decursul zilei și spre sfârșitul perioadei de vegetație energia luminoasă reflectată și cea trecută prin frunze sînt mai mari la intensități mici de lumină.

3. Intensitatea fotosintezei în decursul perioadei de vegetație merge după o curbă cu două maxime și o depresiune corespunzătoare începutului înfloririi plantelor. Diferențele dintre variante nu sînt prea mari.

4. Randamentul fotosintezei față de lumina totală a avut același mers ca și intensitatea fotosintezei, fiind cuprinse între 0,2 și 1,24%.

5. Randamentul fotosintezei față de lumina absorbită a fost mai mare decât randamentul fotosintezei față de lumina totală, fiind cuprins între 0,2 și 2,4%.

BIBLIOGRAFIE

1. ХУДЯКОВ Б. И., *Физиологические биохимические основы продуктивности растений*, Дерзисл. хоспидат, Киев, 1963, 156—160.
2. KAMEL M. S., *Mededel Landbouwhogeschool*, 1958, 58, 3, 1—19.
3. —, *Mededel Landbouwhogeschool*, 1959, 59, 5, 1—102.
4. КЛЕШНИН А. Ф., СТРОГАНОВ Б. П. и ШУЛЬГИН И. А., *Физ. раст.*, 1955, 2, 6, 542—557.
5. MOOS A., LOOMIS W. E., *Plant. Phys.*, 1952, 27, 2, 370—391.
6. НИЧИПОРОВИЧ А. А., *Вопросы ботаники*, 1954, 2, 607—627.
7. —, *Труд. Инст. физ. раст.* им. К. А. Тимирязева, 1955, 10, 210—249.
8. НИЧИПОРОВИЧ А. А. и ЧИМОРА С. Н., *Физ. раст.*, 1958, 5, 4, 320—328.
9. НИЧИПОРОВИЧ А. А., СТРОГАНОВА Л. Е., ЧИМОРА С. Н. и ВЛАСОВА М. П., *Фотосинтетическая деятельность растений в посевах*, Изд. Акад. наук СССР, Москва, 1961.
10. СИДОРОВ М. И., *Бот. журн. СССР*, 1950, 35, 1, 29—39.
11. TANASE VIORICA, *Rev. roum. de biol., Série de Botanique*, 1964, 9, 6, 409—419.
12. WASSINK E. C., *Plant. Phys.*, 1959, 34, 3, 356—361.
13. WASSINK E. C., KOK B. and OORSCHOT J. L. P. van, *On the yield of light energy with higher plants, in: Algar culture from Laboratory to Pilot Plant*, J. S. Burley, Carnegie Inst. of Washington, Publ. 600, 1953, 55—62.

Institutul de biologie „Traian, Șavulescu”
Secția de fiziologie vegetală

Primită în redacție la 11 februarie 1965

REVISTE PUBLICATE DE EDITURA
ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

STUDII ȘI CERCETĂRI DE BIOLOGIE

SERIA BOTANICĂ
SERIA ZOOLOGIE

REVUE ROUMAINE DE BIOLOGIE

SÉRIE DE BOTANIQUE
SÉRIE DE ZOOLOGIE

OCROTIREA NATURII

HIDROBIOLOGIA

LUCRĂRILE INSTITUTULUI DE SPEOLOGIE „EMIL RACOVITĂ”

Revista „Studii și cercetări de biologie — Seria botanică” publică articole originale din toate domeniile biologiei vegetale: morfologie, sistematică, geobotanică, ecologie, fiziologie, genetică și microbiologie — fitopatologie. Sumarele revistei sînt completate cu alte rubrici ca: 1. *Viața științifică*, ce cuprinde unele manifestări științifice din domeniul biologiei vegetale, ca simpozioane, consfătuiri, schimburi de experiență între cercetătorii români și cei străini etc. 2. *Recenzii* ale unor lucrări de specialitate apărute în țară și peste hotare.

NOTĂ CĂTRE AUTORI

Autorii sînt rugați să înainteze articolele, notele și recenziile dactilografiate la două rînduri. Tabelele vor fi dactilografiate pe pagini separate, iar diagramele vor fi executate în tuș, pe hîrtie de calc. Tabelele și ilustrațiile vor fi numerotate cu cifre arabe. Figurile din planșe vor fi numerotate în continuarea celor din text. Se va evita repetarea aceluiași date în text, tabele și grafice. Explicația figurilor va fi dactilografiată pe pagină separată. Citarea bibliografiei în text se va face în ordinea numerelor. Numele autorilor va fi precedat de inițială. Titlurile revistelor citate în bibliografie vor fi prescurtate conform uzanțelor internaționale.

Autorii au dreptul la un număr de 50 de extrase, gratuit.

Responsabilitatea asupra conținutului articolelor revine în exclusivitate autorilor.

Corespondența privind manuscrisele, schimbul de publicații etc. se va trimite pe adresa comitetului de redacție, Splaiul Independenței nr. 296, București.